

عنوان مقاله:

بررسی تاثیر تله نرسینگ بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران کووید-۱۹

محل انتشار:

نشریه پرستاری مراقبت ویژه، دوره ۱۴، شماره ۳ (سال: ۱۴۰۰)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۹

نویسندگان:

رسول رئیس - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran & Department of Health Services Management, Faculty of Health, Islamic Azad University of Tehran, Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

اباسط میرزایی - Department of Health Services Management, School of Health and Health Economics Policy Research Center, Islamic Azad University of Tehran Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

سام ساغری - Department of Health Services Management, Faculty of Health, Islamic Azad University of Tehran, Medical Sciences Branch, Tehran, Iran

مهدی راعی - Health Research Center, Life Style Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سعید بکایی - Department of Food Hygiene and Control, Department of Epidemiology and Common Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

کیاوش هوشمندی - Department of Food Hygiene and Control, Department of Epidemiology and Common Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: اثرات کووید-۱۹ نه تنها در زندگی بیماران اختلال ایجاد می کند بلکه افراد مراقبت کننده را نیز گرفتار می نماید. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تله نرسینگ بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران کووید-۱۹، ترخیص شده از بیمارستان ۲۲ بهمن شهر خواف طراحی و اجرا شد. روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ۱۲۰ مراقب خانوادگی بیمار کووید-۱۹، انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مداخله و کنترل به صورت مساوی تقسیم شدند. در گروه مداخله آموزش از طریق تله نرسینگ مبتنی بر بار مراقبتی، طی مدت یک ماه انجام شد و برای گروه کنترل، مداخله ای صورت نگرفت. هر دو گروه قبل و یک ماه پس از اجرای مداخله، پرسشنامه ی بارمراقبتی زاریت را تکمیل کردند. یافته ها: در مراقبین گروه مداخله، میانگین نمره ی فشار مراقبتی در کل و مولفه های آن بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشت ($P < 0.001$) ولی در گروه کنترل میانگین نمره فشار مراقبتی در کل و مولفه های آن (به جز فشار عینی) قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری نداشت ($P < 0.05$). نتیجه گیری: آموزش از طریق تله نرسینگ باعث کاهش بار مراقبتی در مراقبین خانوادگی بیماران کووید-۱۹ می شود. پیشنهاد می شود مدیران بهداشتی و درمانی، با ایجاد سیاست‌گذاری های مناسب، اجرای فرآیند تله نرسینگ در مراقبین خانوادگی بیماران کووید-۱۹ را در دستور کار خود قرار دهند.

کلمات کلیدی:

Tele-nursing, Caring burden, Family interlocutor, COVID ۱۹ تله نرسینگ، بارمراقبتی، مراقبین خانوادگی، کووید ۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1732396>

