

عنوان مقاله:

شیوع تغییرات مخاط دهان در دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی ناحیه ۳ مشهد

محل انتشار:

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، دوره 28، شماره 1 (سال: 1383)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

عباس جوادزاده - استادیار گروه بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محمود روحانی - استاد گروه اپیدمیولوژی بیمارستان قائم (عج)

خلاصه مقاله:

مقدمه: هدف از این مطالعه اندازه گیری شیوع تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان در دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه مشهد بود. مواد و روش ها: برای تسهیل در به دست آوردن و ثبت اطلاعات پرسشنامه ای تهیه گردید و مجموعاً ۳۰۰ دانش آموز مدارس راهنمایی با محدوده سنی ۱۷-۱۰ سال به صورت تصادفی انتخاب و معاینه شدند. در این مطالعه شیوع تقریباً بیست تغییر مخاطی را اندازه گیری نمودیم. یافته ها: گرانولولهای فوردایس با شیوع ۴/۵۰ درصد، ضایعات قرمز تحریکی با شیوع ۳/۱۸ درصد و زبان جغرافیایی با شیوع ۶/۱۳ درصد به ترتیب شایعترین تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک مخاط دهان و زبان بودند. نتیجه گیری: در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیک مخاط دهان در مقایسه با تغییرات پاتولوژیک از شیوع بالاتری برخوردار بودند ولی هیچکدام در زمان معاینه نیاز به درمان نداشتند و تنها مساله مهم تشخیص افتراقی این تغییرات بود.

کلمات کلیدی:

تغییرات مخاط دهان، شیوع، اپیدمیولوژی، دانش آموزان مدارس راهنمایی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1739215>

