

عنوان مقاله:

بررسی و مقایسه ارتباط میان زایمان طبیعی و سزارین با اختلال تبیدگی (استرس) متعاقب ترومای زایمان

محل انتشار:

دانشور پژوهشی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی)، دوره 19، شماره 3 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسنده‌گان:

مریم مدرس - گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

صادیقه افراصیابی - گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی منتظری - گروه سلامت روان، مرکز تحقیقات بهداشت مادر و کودک، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

پروین رهنما - گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: تجارت ایجادشده در طی زایمان به عنوان تروما می‌تواند در بعضی از زنان، اختلال تبیدگی بعد از زایمان را سبب شود. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ارتباط میان زایمان طبیعی و سزارین با اختلال تبیدگی (استرس) متعاقب ترومای زایمان در شهرستان بوشهر انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی بود. در این مطالعه، نمونه‌گیری در میان ۴۰۰ نفر از زنانی که ۸-۶ هفته از زایمان آنها گذشته بودند، به صورت تصادفی انجام شد. در مرحله اول، زنان با زایمان تروماتیک، تعیین و سپس متغیرهای مورد بررسی، شامل اختلال تبیدگی پس از ترومای، مشخصات جمعیت شناختی و سوابق باروری آنها تکمیل شد. به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل رگرسیون یک و چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که خطر ابتلا به وقوع اختلال تبیدگی متعاقب زایمان از خطر ابتلا به وقوع اختلال تبیدگی متعاقب زایمان اورژانسی داشته‌اند. Odds ratio=۶۹/۱-۰۷/۸، CI ۹۵٪، ۵۵/۳=Odds ratio=۶۹٪. در افرادی که سزارین اورژانسی داشته‌اند، خطر ابتلا به وقوع اختلال تبیدگی متعاقب زایمان کاهش می‌یابد (CI ۹۵٪، =۰۴/۰-۰۵/۵). یافته‌ها بیانگر آن بود که اگر مدت انجام زایمان طبیعی، کمتر از ۳ ساعت باشد، خطر ابتلا به وقوع اختلال تبیدگی متعاقب زایمان کاهش می‌یابد (CI ۹۵٪، =۰۴/۰-۰۵/۵). در میان متغیرهای جمعیتی، درآمد ناکافی، احتمال خطر ابتلا به اختلال مذکور را تا ۵/۴ برابر افزایش می‌داد (CI ۹۵٪، =۰۵/۰-۰۴/۵). در میان متغیرهای جمعیتی، درآمد ناکافی، احتمال خطر ابتلا به اختلال مذکور را کم می‌کرد (CI ۹۵٪، =۰۴/۱-۰۸/۱). نتیجه‌گیری: از آنجاکه انجام سزارین می‌تواند به اختلال تبیدگی بعد از زایمان تروماتیک منجر شود، لذا انجام مشاوره در مواردی که سزارین صورت گرفته است، می‌تواند در کاهش اختلال تبیدگی بعد از ترومای به زنان موثر باشد.

کلمات کلیدی:

اختلال تبیدگی پس از ترومای، عوامل خطر، سزارین اورژانسی، زایمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1739562>

