

عنوان مقاله:

تحلیل مسیر متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی در اختلال بدریختی بدن در یک نمونه دانشجویی

محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 20، شماره 2 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

سلیمه خانجانی - دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

سید عباس حقایق - گروه روان شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

خلاصه مقاله:

مقدمه: اختلال بدریختی بدن یکی از اختلالات روان شناختی شایع با علت شناسی پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مسیر متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی در اختلال بدریختی بدن و ارزیابی مدل پیشنهادی انجام شد. روش کار: جامعه آماری این پژوهش همبستگی شامل دانشجویان واجد تشخیص اختلال بدریختی بدن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بودند. در مرحله اول نمونه گیری ۲۸۰ نفر از دانشجویان با نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسش نامه اختلال بدریختی بدن یل-براون (۱۹۸۶) را تکمیل کردند. ۱۳۰ نفر با نمره ۲۰ یا بالاتر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مرحله دوم، پرسش نامه های اختلال بدشکلی بدن یل-براون (۱۹۸۶)، افکار فراشناختی ولز و متیوس (۱۹۹۴)، نگرش های ناکارآمد وایزمن و بک (۱۹۷۸)، ترس از ارزیابی منفی لری (۱۹۸۳)، کمال گرایی منفی و مثبت بشارت (۱۹۹۲)، نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون (۲۰۰۵)، عزت نفس کوپر-اسمیت (۱۹۶۷)، اضطراب اجتماعی واتسون و فرند (۱۹۶۹) و ویژگی های جمعیت-شناختی را در مدت یک هفته پاسخ دادند. داده ها با نسخه ۱۸ نرم افزار لیزرل و روش آماری تحلیل مسیر مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته ها: مدل پیشنهادی برازش نسبتاً خوبی دارد. ضریب رگرسیون کل مدل معنی دار نبود. با این حال، هفت مسیر از مسیرهای مدل، معنی دار به دست آمد ($P < 0.05$) که به متغیرهای بالینی مربوط بود. نتیجه گیری: بین برخی از متغیرهای بالینی در بیماران واجد تشخیص اختلال بدریختی بدن، روابط معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:

اختلال بدریختی بدن، بالینی، تحلیل مسیر، جمعیت شناختی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1749358>

