

## عنوان مقاله:

تعیین پروتئین قابل متابولیسم کنجاله کانولا عمل آوری شده با موادشیمیایی با استفاده از روش کیسه های نایلونی

## محل انتشار:

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 3

## نویسندگان:

مهدی مقدم - دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

احمد احمدی - کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور

## خلاصه مقاله:

این مطالعه برای تعیین پروتئین قابل متابولیسم کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول 05 درصد اوره و 1/5 درصد هیدروکسید سدیم کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول 0/5 درصد اوره و 0/4 درصد فرمالدئید و کنجاله کانولا عمل آوری شده با محلول 1 درصد هیدروکسید سدیم و 0/4 درصد فرمالدئید با استفاده از روش کیسه های نایلونی درگوسفند قزل انجام شد تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی در زمان های 0، 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت اندازه گیری گردید پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A,B,C به ترتیب 332/52 و 290/98 و 353/49 grkg-1 بودند نتایج نشان دادند که عمل آوری کنجاله کانولا با اوره و فرمالدئید باعث افزایش پروتئین قابل متابولیسم شد.

## کلمات کلیدی:

اوره پروتئین قابل متابولیسم، فرمالدئید، کنجاله کانولا، هیدروکسید سدیم

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/175089>

