

عنوان مقاله:

تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار

محل انتشار:

ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

کبری عطایی - دانشجوی کارشناسی ارشد

حمید صادقی - استادیار دانشگاه آزاد جهرم

بهنام بهروزنام - استادیار دانشگاه جهرم

خلاصه مقاله:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی همیشه بهار (*Calendula officinalis* L.) در سال 1389 در شهرستان داراب آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف سالیسیلیک اسید به ترتیب با صفر 100 و 200 و 300 و 400 میل یگرم در لیتر و دور آبیاری هر روز آبیاری شاهد 2 روز یکبار 3 روز یکبار 4 روز یکبار و 5 روز یکبار آبیاری بودند نتایج نشان داد که اثر دور آبیاری سالیسیک اسید و برهمکنش دور آبیاری و سالیسیلیک اسید و برهمکنش دور آبیاری و سالیسیلیک اسید بر صفات ذکر شده در سطح 1 درصد معنی دار است مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه تعداد گل تعداد بذر و وزن هازردانه تحت تاثیر دور آبیاری شاهد بوده است که به ترتیب 68 سانتی متر 9 عدد 28 عدد و 13 گرم بوده است.

کلمات کلیدی:

همیشه بهار (*Calendula officinalis* L.) سالیسیلیک اسید، تنش خشکی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/175206>

