

## عنوان مقاله:

تاثیر شربت فلوس بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به یبوست

## محل انتشار:

نشریه آموزش پرستاری، دوره 12، شماره 4 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

## نویسندگان:

صادق شیروانی فارسانی - *Shahed University, Department of Nursing*

محمدرضا حیدری - *Shahed University, Department of Nursing*

محسن ناصری - *Shahed University*

پریسا جوادیان - *Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord*

سعید مردانی - *Hajar Hospital, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord*

هدی شیر افکن - *Babol, Babol University of Medical Sciences*

## خلاصه مقاله:

چکیده مقدمه: بیماران تحت همودیالیز با عوارض مختلفی مانند یبوست رو به رو هستند که بر روی کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر شربت فلوس بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مبتلا به یبوست انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی سه سوکور میباشد که در بازه زمانی تیرماه ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ بر روی بیماران تحت همودیالیز در چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. در این کارآزمایی بالینی، ۷۰ بیمار دارای یبوست تحت همودیالیز، به روش در دسترس انتخاب و بعد از تخصیص تصادفی در دو گروه دارو و دارونما تحت بررسی قرار گرفتند. به مدت ۳۰ روز، گروه دارو شربت فلوس ۱۰ درصد (هر ۱ میلی لیتر حاوی یک دهم گرم مغز خشک میوه فلوس) به مقدار ۱۰ میلی لیتر روزانه در دو نوبت و گروه دارونما، شربت پلاسبو به همین میزان دریافت نمودند. در ابتدای مطالعه، برای همه بیماران پرسشنامه دموگرافیک و بالینی تکمیل گردید. قبل و ۳۰ روز بعد از مداخله، پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به یبوست، توسط بیماران تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد. یافته ها: قبل و بعد از مداخله، دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همسان بودند. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد، با توجه به معنی دار نبودن مقدار P-value در نمره ی کل پرسشنامه کیفیت زندگی بیمار مبتلا به یبوست ( $P=251/0$ )، در دو گروه دارو و دارونما به این معنی است که متغیر پیامد (پس آزمون) در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشته و مداخله بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به یبوست تاثیر گذار نبوده است و به بیان دیگر گروه دارونما و دارو اثرگذاری مشابه نسبت به هم داشته اند. نتیجه گیری: استفاده از شربت فلوس در کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی مبتلا به یبوست تاثیری نداشت.

## کلمات کلیدی:

Cassia Fistula, Hemodialysis, Quality of life, constipation, فلوس, همودیالیز, کیفیت زندگی, یبوست

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1756974>



