

عنوان مقاله:

طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی دستورالعمل های ثبت و برچسب گذاری داروهای بیهوشی در اتاق عمل

محل انتشار:

فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی، دوره 12، شماره 1 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

پریسا مرادی مجد - *Department of Anesthesia, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

شقایق تقی زاده - *Department of Anesthesia, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

شهنام صدیق معروفی - *Department of Anesthesia, Faculty of Paramedicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

اعظم ساعی - *Research Center for Trauma in Police Operations, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran*

جمیله ابوالقاسمی - *Department of Biostatistics, Faculty of Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

اهداف: ثبت و برچسب گذاری صحیح داروهای بیهوشی در اتاق عمل از اصول اساسی و مهم در جهت حفظ ایمنی بیمار، کاهش اتلاف داروها و هزینه های متعاقب آن و کاهش آلودگی محیط زیست به شمار می روند. از این رو مطالعه حاضر با هدف طراحی و روانسنجی چک لیست ارزیابی دستورالعمل های ثبت و برچسب گذاری داروهای بیهوشی در اتاق عمل انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی-تحلیلی در سال ۱۴۰۱ در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جهت طراحی چک لیست، جدیدترین و معتبرترین منابع علمی در حیطه بیهوشی مورد بررسی قرار گرفت و از نظرات خبرگان گروه هوشبری دانشگاه استفاده شد. جهت تعیین روایی چک لیست، روایی صوری و محتوایی (شاخص روایی محتوایی و نسبت روایی محتوایی) محاسبه شد. به منظور تعیین پایایی چک لیست از دو روش اعتبار بازآزمایی و توافق بین ارزیابان استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۲ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: چک لیست اولیه با ۱۹ گویه طراحی شد. در بررسی روایی صوری تمامی آیتم ها با دارا بودن حد مطلوب ۱/۵ در چک لیست باقی ماندند. در بررسی روایی محتوایی سه گویه با نسبت روایی محتوایی کمتر از ۶۲٪ و شاخص روایی محتوایی کمتر از ۷۹٪ از چک لیست حذف شدند. ضریب همبستگی درون رده ای در پایایی به روش اعتبار بازآزمایی ۹۹۲٪ و در روش توافق بین ارزیابان ۹۸۷٪ محاسبه شد که نشان دهنده پایایی مطلوب چک لیست بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان دهنده روایی صوری و محتوایی و پایایی مطلوب چک لیست است. بنابراین می توان از آن برای ارزیابی میزان رعایت دستورالعمل های ثبت و برچسب گذاری داروهای بیهوشی استفاده کرد.

کلمات کلیدی:

Psychometrics, Checklist, Registration, Labeling, Anesthetic Drugs
روان سنجی، چک لیست، ثبت، برچسب گذاری، داروهای بیهوشی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1757820>



