

عنوان مقاله:

مقایسه پیامدهای بالینی دو روش دوخت دریچه منقطع و نیمه پیوسته در حین و پس از عمل جراحی دریچه های قلب

محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 28، شماره 1 (سال: 1399)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

احمد آموزشی - Cardiovascular Diseases Research Center, Department of Surgery, School of Medicine, Birjand -
University of Medical Sciences, Birjand, Iran

هادی شریعتی فر - MD, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Birjand University of Medical Sciences, -
Birjand, Iran

سید ابراهیم حسینی - Student Research Committee, Department of Operating Room, Faculty of Paramedicine, Birjand -
University of Medical Sciences, Birjand, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: روش های درمانی و جراحی مختلفی جهت اعمال دریچه قلبی استفاده می شود که روش بخیه نیمه پیوسته و منقطع از جمله این موارد است. لذا هدف ما مقایسه پیامدهای بالینی دو روش دوخت دریچه منقطع و نیمه پیوسته در حین و پس از جراحی تعویض دریچه میترال یا آئورت در بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیرجند بود. روش تحقیق: در این مطالعه کوهورت گذشته نگر اطلاعات مورد نیاز پرونده افرادی که جهت تعویض دریچه آئورت یا میترال از دو روش بخیه نیمه پیوسته یا منقطع استفاده شده است، در چک لیستی بر اساس اهداف مطالعه جمع آوری شد. با بررسی پرونده بیماران عوارض بررسی و در صورت عدم ثبت اطلاعات مورد نیاز با بیمار و یا نزدیکان وی نیز تماس تلفنی گرفته شد تا ضمن ویزیت و مراجعه بیمار به بیمارستان اطلاعات مورد نظر بررسی گردد. یافته ها: میانگین سنی بیماران تحت عمل جراحی در گروه بخیه نیمه پیوسته و منقطع به ترتیب برابر با $53/06 \pm 13/48$ و $52/86 \pm 12/97$ سال بود. توزیع فراوانی رخداد نشت دریچه قلبی، آریتمی، سکته قلبی، عفونت دریچه، نوع دریچه درگیر، در دو گروه با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت. (0/05)

کلمات کلیدی:

Aorta, Interrupted, Mitral, Valve replacement, Valve suture, Semi-continuous
آئورت، دریچه منقطع، میترال، تعویض، دوخت دریچه، نیمه پیوسته

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1783024>

