

عنوان مقاله:

مقایسه فاکتورهای شایع قلبی در سالمندان معتاد و غیرمعتاد شهر بیرجند

محل انتشار:

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 29، شماره 4 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

زینب آرزومندان مفرد - *Student Research Committee, School of Medicine, Social Determinants of Health Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran*

فاطمه سلمانی - *Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health Cardiovascular Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran*

فرشاد شریفی - *Department of Geronoto-Epidemiology, Elderly Health Research Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

میترا مودی - *Department of Geronoto-Epidemiology, Elderly Health Research Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

زویا طاهرگورابی - *Department of Geronoto-Epidemiology, Elderly Health Research Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: جنبه های مرتبط با سن اعتیاد یکی از چالش های مهم سلامت عمومی در دنیا و همچنین ایران محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه فاکتورهای شایع قلبی در افراد معتاد و غیر معتاد سالمند شهر بیرجند انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی ۱۱۵ سالمند (بالای ۶۰ سال) با حداقل یک سال سابقه اعتیاد و ۱۱۵ سالمند بدون سابقه اعتیاد انجام شد. پس از تصویب مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه و اخذ رضایت آگاهانه از افراد پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد تکمیل شد. سپس نمایه توده بدنی (BMI) و فشار خون سیستول و دیاستول نیز تعیین شد. سپس پنج میلی لیتر نمونه خون از هر فرد بعد از ۱۲ ساعت ناشتا بودن برای اندازه گیری قند خون ناشتا (FBS)، پروفایل لیپیدی (HDL، LDL، کلسترول تام و تری گلیسرید) گرفته شد. یافته ها: FBS هیچ تفاوت معنی داری در گروه سالمندان معتاد (مورد) و غیرمعتاد (شاهد) نداشت (۰/۰۵).

کلمات کلیدی:

Fasting blood sugar, HD, LDL, Older adults, Triglyceride
قند خون ناشتا، لیپوپروتئین با دانسیته بالا، لیپوپروتئین با دانسیته پایین، سالمندان، تری گلیسرید

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1783032>



