

عنوان مقاله:

بررسی علل خارج کردن دندان دائمی در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهرستان ساری در سال ۱۳۹۹

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 32، شماره 210 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

رضا مفیدیان - Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

جمشید یزدانی چراتی - Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

پیام عزیز زاده سعادت - Dentistry Student, Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: کشیدن دندان ها به هر دلیلی، تاثیرات منفی در روح و روان انسان می گذارد. به علاوه اختلالاتی در جویدن غذا، شکل ظاهری و تکلم به وجود می آورد. این مطالعه با هدف بررسی علل خارج کردن دندان دائمی در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی دولتی شهرستان ساری در سال ۱۳۹۹، انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی، ۵۲۲ نفر از افرادی که دندان کشیده شده داشتند، به صورت در دسترس انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه افراد با دامنه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال بود و برای مقایسه علل کشیدن دندان در زنان و مردان و سایر ویژگی ها از آزمون کای دو استفاده شد. برای انجام بخش تحلیل از نرم افزار SPSS۲۵ استفاده شد. یافته ها: در افراد مورد بررسی، ۶۴/۸ درصد به دلیل پوسیدگی، ۱۵/۷ درصد به دلیل مشکلات پریدنتال، ۶/۱ درصد به دلیل نیمه نهفتگی دندان، ۵/۴ درصد به دلیل آبسه پری اپیکال، ۴/۸ درصد بنا بر تقاضای بیمار، ۱/۳ درصد به دلیل ارتودنسی، ۱ درصد به دلیل تروما و ۱ درصد هم به سایر دلایل دندان های دائمی خود را خارج کرده بودند. استنتاج: بیماری های پریدنتال و پوسیدگی دندان از مهم ترین دلایل خارج کردن دندان های دائمی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان ساری بودند.

کلمات کلیدی:

tooth extraction, permanent tooth, caries, خارج کردن دندان. دندان دائمی، پوسیدگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1784937>

