

عنوان مقاله:

میزان شیوع حفره خشک ناشی از کشیدن دندان و عوامل مرتبط با آن

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 31، شماره 198 (سال: 1400)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

امیرحسین پاکروان - Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

نادیا الیاسی گرجی - Dentistry Student, Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

پریا وزیری - Dental Surgeon, Sari, Iran

امیرحسین مودبی - Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

محمد ابراهیمی ساروی - Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

تهمینه بامدادیان - Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: حفره خشک (dry socket)، یک عارضه محدود شونده با اتیولوژی نامشخص و التهاب حاد استخوان آلوئولار در ساکت (socket) دندان کشیده شده می باشد که از یک الی سه روز پس از کشیدن دندان با بروز درد شدید ناشی از تخریب کامل یا ناکامل لخته خون درون ساکت، بروز می یابد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع حفره خشک متعاقب کشیدن دندان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان ساری در سال ۱۳۹۷ می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بر روی ۱۱۹۹ بیمار ۶۰-۱۸ سال که از آذر تا اسفند ۱۳۹۷ به واحد دندانپزشکی مراکز درمانی شهرستان ساری مراجعه کرده بودند، انجام شد. پس از توجیه و اخذ رضایت از بیماران، پرسشنامه ای جهت ثبت اطلاعات دموگرافیک و دندانپزشکی بیمار تکمیل شد و طی مدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت پس از خارج سازی دندان توسط دانشجویان سال چهارم و پنجم و دندانپزشکان ارشد، جهت پیگیری با بیماران تماس گرفته شد. سپس تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن ۲۴ صورت گرفت. یافته ها: میزان شیوع حفره خشک در این مطالعه، ۱/۱ درصد بود. شایع ترین دلیل کشیدن دندان، پوسیدگی های وسیع دندانی بود و دندان مولر سوم با فراوانی ۴/۴۵ درصد بیش ترین دندان کشیده شده بود. بر اساس ارزیابی های آماری، افرادی که به هیچ وجه مسواک نمی زدند، بیش تر در معرض حفره خشک قرار داشتند. استنتاج: در این مطالعه تکنیک فلیپ با خروج استخوان، بالاترین شیوع ایجاد حفره خشک را داشت، در حالی که روش خارج سازی ساده از کم ترین شیوع ایجاد حفره خشک برخوردار بود.

کلمات کلیدی:

dry socket, pain, surgery, حفره خشک, درد, جراحی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

