

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال ۱۳۹۵

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 28، شماره 167 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

محمود وکیلی - Associate Professor, Department of Community Medicine, Health Monitoring Research Centre, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi - University of Medical Sciences, Yazd, Iran

محسن میرزایی - General Practitioner, Yazd Cardiovascular Research Centre, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

سید علی ضیاء کاشانی - Medical Student, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

زهرا محمدی - Medical Student, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

مهرداد منصوری - Medical Student, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سردرد جزء شایع ترین شکایات های پزشکی می باشد. یکی از علل مهم و شایع آن میگرن است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد بوده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به روش مقطعی در سال ۱۳۹۵ انجام شد. تعداد ۴۰۰ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد به روش تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد خودایفا، مطابق معیارهای بین المللی سردرد (IHS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS۱۶ تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: از ۴۰۰ دانشجوی مورد مطالعه ۵۸ درصد مونث و ۵/۷۲ درصد مجرد بودند. ۵/۷۵ درصد درمقطع بالینی تحصیل کرده و ۷/۵۱ درصد ساکن خوابگاه بودند. شیوع میگرن، ۳/۱۰ درصد بدست آمد که در زنان ۳۴/۱۲ درصد و در مردان ۲۷/۷ درصد بود. ۲۹ درصد بیماران میگرن اورا داشتند. سردرد یک طرفه ضربان دار ($p = 0.00/0$) و همراهی سردرد با تهوع، استفراغ ($p = 0.00/0$)، ترس از صدا ($p = 0.35/0$) و نور ($p = 0.00/0$) در بیماران مبتلا به میگرن بیش تر و سردرد مبهم ($p = 0.01/0$) در غیرمیگرنی ها شایع تر بود. اکثر سردردهای میگرنی ($5/80$ درصد) متوسط/شدید و بیش تر سردردهای غیرمیگرنی ($3/56$ درصد) خفیف بودند ($p = 0.00/0$). سابقه خانوادگی مثبت ($p = 0.28/0$)، مراجعه به پزشک ($p = 0.00/0$) و تسکین سردرد با دارو ($p = 0.35/0$) در میگرنی ها شایع تر بود. استنتاج: شیوع میگرن در این مطالعه مشابه سایر مطالعات بود. چون اکثر سردردهای میگرنی متوسط و شدید بوده و به مداخلات درمانی نیاز دارد، توجه به این بیماری و کنترل عوامل تشدیدکننده به ویژه در دانشجویان پزشکی اهمیت زیادی دارد.

کلمات کلیدی:

migraine, medical students, prevalence, Iran, سردرد, دانشجویان پزشکی, شیوع

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1786071>

