

عنوان مقاله:

همه گیر شناسی مبتلایان به سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 28، شماره 166 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

قاسم جان بابایی - Associate Professor, Department of Hematology and Oncology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

مژده سرمدی کیا - MSc Student in Consultation in Midwifery, Student Research Committee, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

مریم کاردان سورکی - MSc in Consultation in Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

محمود موسی زاده - Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

صغری خانی - Assistant Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

محبوبه جانباز - Bachelor of Midwifery, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سرطان تخمدان نسبت به سایر بدخیمی های ژنیکولوژیک در میان زنان، بالاترین علت کشندگی را به خود اختصاص داده است. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و برخی ویژگی های اپیدمیولوژیکی می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر حسب موقعیت جغرافیایی و تشخیص زود هنگام ایفا کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های همه گیر شناسی سرطان تخمدان در زنان مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری انجام پذیرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، حجم نمونه ۱۳۰ بیمار برآورد شد که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. منبع دریافت داده ها، مرکز جامع سرطان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ابزار گردآوری داده ها چک لیست بوده است. داده ها توسط نرم افزار SPSS ver.۲۴ و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه بیش تر مبتلایان در گروه سنی ۴۰-۶۰ سال بودند و ۷۱ درصد موارد سرطان تخمدان با منشا اپیتلیال بوده است. درصد بالایی از موارد گزارش شده (۳۰ درصد) در مرحله بندی ۴ (Stage IV) قرار گرفتند. استنتاج: با توجه به میزان کشندگی بالا و نیز مرحله بالای سرطان تخمدان در زمان تشخیص، می توان با آموزش به زنان در مورد عوامل خطر و فاکتورهای محافظتی سرطان تخمدان، از وقوع بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کرد

کلمات کلیدی:

ovarian cancer, epidemiology, stage, metastasis, سرطان تخمدان، اپیدمیولوژی، مرحله، متاستاز

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1786113>



