

عنوان مقاله:

مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 28، شماره 166 (سال: 1397)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

نویسندگان:

زهرآ کامالی - MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

مهین تقضی - Midwifery Instructor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

مهدی ابراهیمی - Assistant professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

محمدعلی حسینی - Associate Professor, Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

آزاده ساکی - Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

محمد رضا فیاضی بردبار - Professor, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

آلا صابر محمد - MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

زهرآ محبی دهنوی - Midwifery Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: زنان پره اکلامپسی، مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، می باشند. با توجه به جایگاه رفیع سلامت معنوی در حوزه بهداشت و سلامت، و همچنین اهمیت زیاد اختلالات بعد روان و در راس آن ها استرس، اضطراب و افسردگی در روند درمان، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، انجام پذیرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی ۲۷۸ زن چند زایا با سن بارداری ۳۰-۳۶ هفته، مبتلا به پره اکلامپسی و بستری در بیمارستان های دولتی شهر مشهد، در سال ۱۳۹۶ پرداخته شد. گردآوری داده ها با پرسشنامه های اختلال استرس پس از ضربه زایمان (PPQ)، اختلال استرس پس از ضربه (PCL)، داس ۲۱ و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون انجام گردید. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶، و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی و اسپیرمن بررسی شدند و سطح معنی داری $p < 0.05$ در نظر گرفته شد. یافته ها: در بین بیماران ۶۸ نفر (۲۶ درصد)، مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان بودند که بین اختلال استرس پس از ضربه زایمان، با سلامت معنوی ($p = 0.03$)، افسردگی ($p = 0.01$)، استرس ($p = 0.00$) و اضطراب ($p = 0.00$)، در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، ارتباط آماری معنی دار بوده است. استنتاج: سلامت معنوی پایین، افسردگی، اضطراب و استرس پس از زایمان، زنان مبتلا به پره اکلامپسی را، بیش تر مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان می کند.

کلمات کلیدی:

post-traumatic stress disorder, preeclampsia, spiritual health, stress
معنوی، استرس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1786116>



