

## عنوان مقاله:

رابطه بین معنویت و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

## محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 27، شماره 156 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

## نویسندگان:

اکبر هدایتی زاده عمران - *Assistant Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran*

قاسم جان بابایی - *Associate Professor, Department of Oncology and Hematology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran*

مریم فرجی امانتی - *MSc in Clinical Psychology, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

اصغر نوروزی - *PhD Candidate in Health Psychology in Kharazmi University, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran*

شهره کلاگری - *Assistant Professor, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

مهناز مدانلو - *Assistant Professor, Nursing Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran*

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: سرطان به عنوان یکی از بیماری‌های با شیوع بالا می‌تواند منجر به بروز مشکلات هیجانی و روانشناختی هم چون اضطراب مرگ شود. از سوی دیگر، سلامت معنوی می‌تواند سازگاری بیمار مبتلا به سرطان با بیماری و اضطراب آن را بهبود بخشد. این مطالعه با هدف تعیین نقش معنویت در پیش بینی اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-همبستگی، بر روی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی شهر ساری در سال ۱۳۹۶ انجام شد. تعداد ۱۰۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه معنویت و اضطراب مرگ تمپلر انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها: نمره ی اضطراب مرگ ۴۹ درصد بیماران بالا (۸ و یا بیش تر) بود. میانگین اضطراب مرگ و معنویت بیماران به ترتیب  $39/8 \pm 96/2$  و  $44/85 \pm 59/11$  بود. بین اضطراب مرگ و معنویت رابطه وجود نداشت ( $P > 0.05$ )، اما بین اضطراب مرگ و ابعاد معنویت رابطه وجود داشت. سطح اضطراب مرگ بیماران بیشترین همبستگی را با بعد فعالیت‌های معنوی و کمترین همبستگی را با بعد نیازهای معنوی داشت، بدین معنی که با افزایش نمره بعد فعالیت‌های معنوی، سطح اضطراب مرگ بیماران کاهش می‌یافت. استنتاج: براساس یافته‌های پژوهش که مولفه ی اعتقادات معنوی در زندگی پیش بین مناسبی برای اضطراب مرگ بیمار مبتلا به سرطان است، می‌توان با تمرکز بر آموزش معنویت برای این بیماران از بروز و یا شدت اضطراب مرگ آنان کاست.

## کلمات کلیدی:

cancer, chemotherapy, spirituality, death anxiety, سرطان, شیمی درمانی, معنویت, اضطراب مرگ

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1786503>

