

عنوان مقاله:

هیستوزیس سلول لانگرهانس در برابر استئومیلیت در مندیبل بیمار ۳۰ ساله - گزارش یک مورد

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 26، شماره 138 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

امیرحسین پاکروان - Assistant Professor, Department of Oral and maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

پویا جنتی - Dentistry Student, Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

مهران منصوری - Oral and Maxillofacial Surgeon, Sari, Iran

تهمینه بامدادیان - Assistant Professor, Department of Prosthodontics Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

میلاد کرمو - Dentist, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

اُئوزینوفیلیک گرانولوما (Eosinophilic Granuloma)، نوع موضعی و خوش خیم ترین نوع هیستوزیس سلول های لانگرهانس است که می تواند به تنهایی یا به شکل چندگانه ای رخ دهد. شیوع این بیماری در مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱ نفر در هر ۹۱۰۰۰۰۰ گزارش شده است. اُئوزینوفیلیک گرانولوما می تواند هر نوع استخوانی را درگیر نماید، اما وقتی درگیری استخوان فک رخ دهد، فکی که متاثر می شود، معمولا مندیبل می باشد. درمان متداول هیستوزیس سلول های لانگرهانس جراحی، رادیوتراپی، کموتراپی و تزریق استروئید (به تنهایی یا در ترکیب با داروهای دیگر) است. بهبود و عقب نشینی خود به خودی بیماری نیز گزارش شده است. در این مطالعه، بیمار مردی ۳۰ ساله است که LCH وی در مندیبل گزارش می شود. بیمار تمامی دندان های مندیبل را به علت تشخیص ابتدایی نادرست بیماری به عنوان پریدونتیت یا استئومیلیت از دست داده بود.

کلمات کلیدی:

Langerhans cell histiocytosis, Eosinophilic granuloma, osteomyelitis, periodontitis, هیستوزیس سلول لانگرهانس، LCH، اُئوزینوفیلیک گرانولوما

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1787808>

