

عنوان مقاله:

مطالعه ارتباط عوامل خطر ساز با شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 111 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

رمضان حسن زاده - علوم پزشکی مازندران

سید حمزه حسینی - علوم پزشکی مازندران

محمود عابدینی - علوم پزشکی مازندران

حسن عنایتی - علوم پزشکی مازندران

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: افسردگی پس از سکته مغزی شایع ترین اختلال خلقی در بیماران مبتلا است. سکته مغزی یکی از بیماری های نوروژیک و از مشکلات عمده سلامت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی و رابطه آن با عوامل خطرساز میباشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی به روش نمونه گیری در دسترس، روی ۱۱۶ بیمار مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان بوعلی سینا ساری انجام گرفت. تشخیص سکته مغزی بر اساس تشخیص بالینی متخصص مغز و اعصاب با استفاده از سی تی اسکن یا ام آر آی مغز تایید شده بود. فراوانی افسردگی بر اساس DSMIV و پرسشنامه HADS تعیین و عوامل خطر ساز بر اساس نتایج آزمایشات پاراکلینیک، پس از تفسیر و تایید متخصص همراه با اطلاعات دموگرافیک در پرسشنامه ثبت شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۶ و تست های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که ۴۷/۴ درصد بیماران دچار افسردگی بودند. فراوانی افسردگی در زنان ۲۹/۳ درصد و در مردان ۱۸/۱ درصد بود. وفور افسردگی در زنان به طور معنی داری بیش تر از مردان بود. هیچ ارتباط معنی داری بین افسردگی با سن و سطح تحصیلات بیماران وجود نداشت ولی بین افسردگی بیماران پس از سکته مغزی و عوامل خطر ساز سکته مانند جنس، قند خون بالا (دیابت)، فشار خون بالا (هیپرتانسیون)، ارتباط معنی داری وجود داشت. با استفاده از آزمون کیفی مجذور کای دو، بیماری های قلبی ارتباط معنی داری با افسردگی بیماران داشت ولی در رگرسیون لجستیک فرضیه تحقیق پیش بینی و تایید نگردید. استنتاج: به طور کلی نتایج نشان می دهد که افسردگی متعاقب سکته مغزی از فراوانی بالایی در جامعه برخوردار میباشد و افسردگی پس از سکته مغزی با عوامل خطرسازی هم چون جنس، دیابت و هیپرتانسیون ارتباط دارد که تشخیص، درمان و مداخله به موقع می تواند از افسردگی بیماران، خصوصاً درجنس م و نث کاسته و امید به زندگی را افزایش دهد و در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران خواهد شد.

کلمات کلیدی:

Depression, stroke, risk factor, عوامل خطر ساز, سکته مغزی, افسردگی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1789127>

