

عنوان مقاله:

بررسی برخی از عوامل مرتبط با شروع و تداوم استعمال دخانیات در اصفهان

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 25، شماره 123 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

نویسندگان:

مهدی محمدیان - *MSC in Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

نضال صراف زادگان - *Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

معصومه صادقی - *Assistant Professor, Isfahan Cardiac Rehabilitation Research Center, Cardiovascular Research Institute, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

حمید صالحی نیا - *Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran and PhD Student in Epidemiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

حمید رضا روح افزا - *Assistant Professor, Cardiac Rehabilitation Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

شیدخت حسینی - *BSc in Nursing, Hypertension Research Center, Cardiovascular Research Institute, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran*

سلمان خزایی - *PhD Student in Epidemiology, School of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran*

عبدالله محمدیان هفشجانی - *PhD Student in Epidemiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran*

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی برخی از عوامل مرتبط با شروع و تداوم استعمال سیگار در شهرستان اصفهان انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی بر پایه برنامه قلب سالم اصفهان می باشد. جهت محاسبه نسبت شانس خام و تطبیق شده از رگرسیون لجستیک استفاده شد، گروه دارای کم ترین شیوع استعمال دخانیات، به عنوان گروه پایه در نظر گرفته شد و نسبت شانس برای سایر اجزای آن متغیر را بر مبنای گروه پایه محاسبه شد و با فاصله اطمینان ۹۵ درصد گزارش شد. یافته ها: ۳۱۶۴ نفر به مطالعه وارد شدند که ۳/۱۲ درصد از افراد (مردان ۳/۲۳ و زنان ۴/۰۱ درصد) سیگاری بودند، نسبت شانس استعمال سیگار در مردان (۵۷/۱۶-۵۳/۸(۳۷/۴) در مناطق روستایی (۷۱/۱-۱۷/۱(۸/۰) و در افراد بی سواد (۲۲/۱-۷/۱۶)۵۲/۴) بود. افراد در گروه سنی ۱۹ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۳۴ سال بیش ترین نسبت شانس استعمال سیگار را داشتند. بیش ترین مکان استفاده از سیگار خانه (۳۲/۶۴ درصد)، بیش ترین موقعیت استفاده سیگار در زمان عصبانیت (۳۶/۷۰ درصد) و بیش ترین علت شروع و یا ادامه مصرف سیگار از نظر افراد سیگاری تفریح و سرگرمی (۴۵/۶۵ درصد) بود. استنتاج: بیش ترین مصرف کنندگان سیگار عبارتند از: مردان، افراد با تحصیلات پایین و جمعیت روستایی و افراد با شغل آزاد یا بیکار، بنابراین باید در انجام برنامه های آموزشی در حیطه آگاهی، نگرش و عملکرد و هم چنین برنامه های ترک سیگار به این گروه ها توجه بیش تری شود.

کلمات کلیدی:

,Smoking, odds ratio, logistic regression, Isfahan Healthy Heart Program, Iran

سیگار, نسبت شانس, رگرسیون لجستیک, برنامه قلب سالم اصفهان, ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1789943>

