

عنوان مقاله:

مقایسه توجه مستمر و سرعت واکنش بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 115 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

مهدیه عزیزپور - علوم پزشکی مازندران

محمدعلی محمدی فر - علوم پزشکی مازندران

محمود نجفی - علوم پزشکی مازندران

افسانه فاعلی - علوم پزشکی مازندران

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن در سیستم عصبی مرکزی است که مشکلاتی از قبیل کارکرد نامناسب شناختی را به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه توجه مستمر و زمان واکنش در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس آنان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای و شامل ۱۰۸ نفر (۵۴ نفر گروه مبتلا به MS از نوع عود-بهبود و ۵۴ نفر گروه غیر مبتلا) بود که مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و آزمون رایانه ای عملکرد پیوسته روی افراد اجرا شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در توجه مستمر و سرعت واکنش بین دو گروه وجود دارد. همچنین این تفاوت با توجه به سطوح افسردگی، اضطراب و استرس نیز وجود داشت. استنتاج: بیماری MS منجر به نقص در توجه مستمر و زمان واکنش می شود و افسردگی، اضطراب و استرس این نقص را تشدید می کند.

کلمات کلیدی:

Multiple sclerosis, sustained attention, reaction time, depression, anxiety, stress

مولتیپل اسکلروزیس، توجه مستمر، سرعت واکنش، افسردگی، اضطراب و استرس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1790071>

