

عنوان مقاله:

بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 121 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

لیلا امینی - Lecturer, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مریم حیدری - Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

انوشه حقیقی - Associate Professor, Department of Rheumatology, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

فاطمه رحیمی کیان - Lecturer, Nursing and Midwifery Care Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

چکیده سابقه و هدف: لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) یک اختلال خود ایمن با علت ناشناخته است. ۹۰ درصد موارد لوپوس را زنان تشکیل می دهند. این بیماری به علت ماهیت مزمن، دردناک و ناتوان کننده آن می تواند تأثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی فرد که شامل تمایلات جنسی و باروری وی نیز هست بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی ۱۹۶ زن مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های FSFI و پرسشنامه مشخصات فردی بود. یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در حیطه های تمایل جنسی $21/4 \pm 49/1$ ، تهییج جنسی $32/3 \pm 57/1$ ، لوبریکاسیون واژن $69/3 \pm 72/1$ ، ارگاسم $48/3 \pm 61/1$ ، رضایت جنسی $68/2 \pm 00/1$ ، دیسپارونیا $77/4 \pm 55/2$ و در مورد نمره کل $18/22 \pm 98/5$ بوده است. بیش ترین اختلال در حیطه رضایت جنسی و کم ترین اختلال را در حیطه های لوبریکاسیون واژن، ارگاسم و دیسپارونیا مشاهده شد. هم چنین ۶/۳۱ درصد از نمونه ها دارای اختلال عملکرد جنسی متوسط و ۸/۱۴ درصد دارای اختلال عملکرد جنسی خفیف بوده و هیچ یک از آنان اختلال عملکرد جنسی شدید را گزارش ننمود. مقایسه عملکرد جنسی زنان شرکت کننده در این پژوهش بر حسب سن نشان داد که اختلال عملکرد جنسی در زنان بالای ۴۵ سال نسبت به دیگر گروه های سنی به طور معناداری بالاتر می باشد ($p < 0.001$). هم چنین مقایسه عملکرد جنسی بر اساس طول مدت ازدواج نیز نشان داد که زنان با طول مدت ازدواج بیش تر از ۱۵ سال بهترین عملکرد را در حیطه های رضایت جنسی ($p < 0.001$)، دیسپارونیا ($p < 0.001$) و تمایل جنسی ($p < 0.001$) نسبت به دیگر زنان داشتند. استنتاج: از آن جا که لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری التهابی مزمن است که با فازهای متناوبی از بهبودی و تشدید علائم بالینی همراه است، علاوه بر عوارض جسمانی، تأثیرات بالقوه گسترده ای روی عملکرد روانی- اجتماعی افراد مبتلا دارد و می تواند تأثیر منفی روی عملکرد جنسی زنان مبتلا و به ویژه زنان با سن بالاتر از ۴۵ سال نیز داشته باشد. آگاهی مراقبت کنندگان از این مشکلات، ممکن است در جهت درمان و اداره مناسب بیماری و عوارض آن در جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کننده باشد.

کلمات کلیدی:

Lupus Erythematosus, female sexual function, quality of life, female sexual disorder

لوپوس اریتماتوز، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی زنان، اختلال جنسی زنان

