

## عنوان مقاله:

بررسی وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور

## محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 24، شماره 119 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 12

## نویسندگان:

مینا مطلب نژاد - Associate Professor, Department of Oral & Maxillofacial Medicine, Faculty of Dentistry, Babol -  
University of Medical Sciences, Babol, Iran

عاطفه نوغانی - General Dentist

احمد تمدنی - Associate Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Babol university of Medical  
Sciences, Babol, Iran

ثریا خفری - Assistant Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Babol University of Medical  
Sciences, Babol, Iran

## خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در مرکز تالاسمی امیرکلا می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی مقطعی ۲۵۰ بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور از لحاظ وضعیت مخاطی و سلامت دندان (ایندکس DMFT) مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسش نامه های مربوط به کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان (GOHAI-Per) و (OHIP-۱۴-Per) و پرسش نامه خشکی دهان تکمیل شد. در نهایت اطلاعات توسط نرم افزار SPSS وبا استفاده از آزمون T-test برای داده های کمی و آزمون کای دو برای داده های کیفی آنالیز شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران  $5/25 \pm 7/8$  سال بود. ۲/۵۵ درصد از شرکت کنندگان زن بودند. ۶/۱۷ درصد از خشکی دهان رنج می بردند. ۲۶ درصد سلامت دهانی خوب، ۲/۵۷ درصد سلامت دهانی متوسط و ۸/۱۶ درصد سلامت دهانی بد را گزارش کردند. ۶/۳۹ درصد بیماران نیاز درمانی را گزارش کردند. DMFT بیماران، ۸۴/۸  $\pm 2/6$  بود. ۳۸ درصد مخاط رنگ پریده، ۳۰ درصد تغییر رنگ دندان، ۴/۲۰ درصد سابقه آفت دهانی و ۶/۱۱ درصد پیگمانتاسیون داشتند. میانگین  $5/2/10 \pm 5/4/5/9$  OHIP-۱۴-ADD (از دامنه ۱۴ تا ۷۰) و میانگین  $5/6/8 \pm 0/1/4/8$  GOHAI-ADD (از دامنه ۱۲ تا ۶۰) به دست آمد. اطلاعات به دست آمده نشان داد که وضعیت سلامت دهان بر جنبه های سایکولوژیک کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان بیش تر از جنبه ی عملکردی اثر می گذارد. افرادی که بتا به گزارش خود سلامت دهانی بهتری داشتند، جوان تر بوده، میانگین DMFT پایین تر از داشته و کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان بالاتری داشتند. استنتاج: علی رغم وجود وضعیت سلامت و بهداشت دهان ضعیف، این مسئله تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی این گروه از بیماران نمی گذارد.

## کلمات کلیدی:

Beta-thalassemia, dental caries, quality of life, بتا تالاسمی، پوسیدگی های دندان، کیفیت زندگی

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1790224>



