

عنوان مقاله:

شکستگی آلت تناسلی در مردان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل، سال ۸۳-۱۳۷۵

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 15، شماره 49 (سال: 1384)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

حمید شافی

ارسلان رمجی

علی اکبر کسایان

یوسف رضا یوسف نیاپاشا

میرمحمد رضا آقاچانی میر

ابوذر اکبرزاده پاشا

عباس قاسم پور

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: شکستگی آلت تناسلی در جوامع و فرهنگ های مختلف به دلایل متعددی از قبیل مقاربت جنسی در وضعیت غیر عادی، خودارضایی و ضربه مستقیم ایجاد می گردد. هدف از این مطالعه کسب آگاهی از فراوانی، علل و ضایعات همراه به خصوص پارگی پیشابراه در این بیماران بوده تا بتوان با آگاهی و شناسایی علل در پیشگیری از ضایعه و عوارض آن گامی موثر برداشت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و بر روی کلیه مردان مراجعه کننده به علت شکستگی آلت تناسلی (۸۴ مورد) به بیمارستان شهید بهشتی بابل (۸۳-۱۳۷۵) انجام شد. داده ها با پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS و روش های آماری کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در طی مدت مطالعه، ۸۴ بیمار به علت شکستگی آلت تناسلی به بیمارستان مراجعه کردند. میانگین سنی نمونه ها 4.7 ± 2.8 سال و اکثریت آنان (۷۸ درصد) مجرد بودند. مهم ترین شکایت بالینی، درد (۳۶ درصد) و تورم آلت (۳۰ درصد) بود. علل زمینه ای ایجاد کننده شکستگی؛ خود ارضایی (۷۴ درصد)، آمیزش جنسی (۱۸ درصد) و اطلاعات مشکوک و تروما و جسم خارجی (۸ درصد) بود. فراوانی پارگی پیشابراه در این بیماران (۸ درصد) بود و ارتباط معنی داری بین علل زمینه ای ایجاد شکستگی و پارگی پیشابراه وجود داشت. استنتاج: با توجه به درصد زیاد موارد شکستگی آلت به علت دستکاری در بین جوانان، آموزش این گروه در مورد پیامدها و عوارض مهم این مشکل، می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان به موقع این ضایعه و عوارض آن داشته باشد.

کلمات کلیدی:

Penile fracture, Urethral rupture, Frequency, Etiology, شکستگی آلت تناسلی، پارگی پیشابراه،

جسم غاری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1792219>

