

عنوان مقاله:

بررسی شیوع ناباروری در مناطق مرکزی مازندران در سال ۱۳۷۸

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره ۱۰، شماره ۲۷ (سال: ۱۳۷۹)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۷

نویسندگان:

امیر اسماعیل نژادمقدم

عباس علی کریم پورملک شاه

فرشته طالب پورامیری

فاطمه تارینگو

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: ناباروری که عبارت از بچه دار نشدن زوج پس از یک سال زندگی زناشویی است، یکی از مشکلات مهم بهداشتی- اجتماعی جوامع مختلف محسوب می شود. شیوع نازایی در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است، بگونه ای که مقدار آن در گزارشهای مختلف از ۵ درصد بیش از ۳۰ درصد آمده است. به دلیل اهمیت تعیین میزان ناباروری در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی و نیز عدم انجام چنین کاری در استان، در پژوهش حاضر شیوع آن در مناطق مرکزی استان مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: نمونه گیری به روش خوشه ای- تصادفی از ۱۵ منطقه شهری، شهرهای ساری، قائم شهر و نکا و نیز ۵۰ روستای تابع شهرهای مذکور و با استفاده از روش مصاحبه با زنان در درب منازل توسط دو گروه آموزش دیده از دانشجویان پزشکی و مامایی انجام پذیرفت. نتایج: شیوع ناباروری در این مطالعه ۲/۱۳ درصد و میزان ناباروری حل نشده ۴ درصد بوده است. ارتباطی بین شیوع ناباروری و ازدواج فامیلی مشاهده نشد، اما بین شیوع آن و سابقه فامیلی ارتباط معنی داری دیده می شود. همچنین ۴/۲۹ درصد از افراد در گروه نابارور حداقل یک بار سقط جنین داشته اند، در حالی که این نسبت در گروه بارور بطور معنی داری کم تر و فقط در حدود ۱۶/۳ درصد بوده است. استنتاج: شیوع بالای ناباروری ضرورت توجه به بهداشت باروری در مراکز و خانه های بهداشتی و نیز راه اندازی مراکز درمان نازایی را مورد تاکید قرار می دهد.

کلمات کلیدی:

Infertility, Prevalence, Subfertility, Spontaneous abortion, ناباروری، شیوع، ضعف باروری، سقط آنی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1792501>

