

عنوان مقاله:

بررسی سوء مصرف مواد و استعمال سیگار در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ و غیر کووید-۱۹ در شهر کاشان

محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 25، شماره 4 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

Amir Ghaderi - *Department of Addiction Studies, School of Medical and Clinical Research Development Unit-Matini/Kargarnejad Hospital, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

.Zahra Pilevar - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

.Zahra Rasoolian - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

.Shaghayegh Keyvandarian - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

.Kiomars Cheraghi - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

Mohammd-Javad Azadchehr - *Clinical Research Development Unit of Kashan Shahid Beheshti hospital, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

Fateme Padoei - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

.Peyman Mamsharifi - *Department of Psychology, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran*

.Bahador Nemati - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

Heshmatollah Moradpour Ghalerashidi - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

Mohammad Hadi Farahzadi - *Research Center of Addiction and Behavioral Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran*

Hamid Reza Banafshe - *Department of Addiction Studies, School of Medical and Clinical Research Development Unit-Matini/Kargarnejad Hospital, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. Department of Pharmacology, School of Medicine, Kashan University of*

Peyman Esmaili-Shahzade-Ali-Akbari - *Student Research Committee, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran. Department of Addiction Studies, School of Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: کرونا یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی در جهان است. مطالعات نشان می دهد که افراد سیگاری یا معتادان در برابر این ویروس، آسیب پذیرتر هستند. مطالعه حاضر فراوانی استعمال دخانیات و سوء مصرف مواد را در بین بیماران مبتلا به کووید-۱۹ و سایر بیماران مورد ارزیابی قرار داد. روش کار: در این پژوهش ۱۴۰۰ شرکت کننده از شهر کاشان (۷۰۰ بیمار در گروه کووید-۱۹ و ۷۰۰ نفر در گروه غیرکووید-۱۹) وارد مطالعه شدند. سپس پرسشنامه تشخیص اعتیاد (ASSIST) را تکمیل کردند و اعتیاد آنها با کیت تشخیصی آزمایش شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، مجذور خی، آزمون دقیق فیشر و SPSS نسخه ۱۷، تحلیل شدند. یافته ها: شیوع مصرف سیگار و مصرف مواد، در گروه کووید-۱۹ به ترتیب ۴/۱۹ درصد و ۴/۴ درصد (به ترتیب ۲۳/۰ درصد و ۲/۹ درصد در گروه غیر کووید-۱۹) بود. تفاوت معنی داری در مصرف سیگار بین دو گروه مشاهده نشد ($P=0.229$). نتایج نشان داد که فراوانی مصرف کنندگان مواد در گروه کووید-۱۹ به طور معنی داری کمتر بود ($P=0.008$). نتیجه گیری: نتایج حاضر نشان داد که شیوع استعمال دخانیات در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ تفاوت معنی داری با سایر بیماران ندارد. جالب توجه است که شیوع سوء مصرف مواد در میان شرکت کنندگان مبتلا به کووید-۱۹ به طور قابل توجهی کمتر از سایر بیماران بود. از آنجایی که انتظار می رفت تعداد افراد سیگاری یا مصرف کننده مواد در بین بیماران مبتلا به کووید-۱۹ بیشتر باشد، علت این تضاد، نامشخص است و برای روشن شدن ابعاد مختلف آن به مطالعات بیشتری نیاز است.

کلمات کلیدی:

اعتیاد، کووید-۱۹، مصرف سیگار

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1798568>

