

عنوان مقاله:

تاب آوری و اضطراب کرونا در ایران: نظرسنجی آنلاین بین کارکنان بهداشتی و غیربهداشتی

محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 25، شماره 5 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

Shakiba Gholamzad - MA. in mental health, Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Azam Sadat Heydari Yazdi - Assistant professor of child and adolescent psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Zanireh Salimi - Assistant professor of psychiatry, Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Narges Saeidi - MA. in health psychology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Saeedeh Hajebi Khaniki - Department of Biostatistics, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

Reza Noori - Assistant professor of psychiatry, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran

Najmeh Shahini - Assistant professor of psychiatry, Golestan Research Center of Psychiatry (GRCP), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Behnaz Khodabakhshi - Associate professor, Infectious Disease Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: کارکنان بهداشتی و درمانی در خط مقدم مبارزه با بیماری قرار دارند و بدون شک بیشترین مسئولیت و بار استرس را بر عهده دارند. آنها تحت فشار شدید جسمی و روحی هستند. این مطالعه اضطراب ناشی از کرونا و تاب آوری را در کارکنان مراقبت های بهداشتی و غیربهداشتی مقایسه کرد. روش کار: این مطالعه مقطعی با استفاده از پرسشنامه خودگزارشی آنلاین در ایران انجام شد. نمونه شامل ۱۰۲ کارمند بهداشت و درمان و ۱۲۳ کارمند غیر بهداشتی بود که پرسشنامه شبکه اجتماعی را از ۱ تا ۹ مارس ۲۰۲۱ تکمیل کردند. شرکت کنندگان با استفاده از مقیاس تاب آوری Connor-Davidson (CD-RISC) و مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، مجذور خی، تی، من ویتنی، آنکووا و SPSS ۱۶ تحلیل شدند. یافته ها: کووید-۱۹ منجر به اضطراب به طور معنی داری در کارکنان مراقبت های بهداشتی درعلائم جسمی نسبت به کارکنان غیربهداشتی شده است ($P=0.027$). همچنین، پرسنل بهداشتی نمره بالاتری در CDAS داشتند ($P=0.029$). امتیاز کلی CD-RISC نیز در بین کارکنان غیربهداشتی 6.90 ± 9.13 و در بین کارکنان بهداشتی و درمانی 11.84 ± 8.19 بود ($P=0.036$). پس از تعدیل برای اثر مخدوش کننده احتمالی سطح تحصیلات، مجدداً نمرات کل دو مقیاس بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت ($P < 0.05$). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، کووید-۱۹ منجر به اضطراب بالاتر و تاب آوری کمتر در کارکنان مراقبت های بهداشتی نسبت به کارکنان غیربهداشتی شده است.

کلمات کلیدی:

اضطراب، تاب آوری، کارکنان بهداشتی، کووید-۱۹

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1798575>



