

## عنوان مقاله:

مقایسه ی تنش والدگری مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با مادران کودکان بهنجار

## محل انتشار:

مجله اصول بهداشت روانی، دوره 11، شماره 42 (سال: 1388)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

## نویسنده:

شکیلا یوسفی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

## خلاصه مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی سطح تنش والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه و مقایسه ی آن با مادران کودکان بهنجار انجام شده است. روش کار: مطالعه ی حاضر جزو پژوهش های علی مقایسه ای می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش تمام مادران دارای پسر ۵ تا ۱۲ ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه مراجعه کننده به درمانگاه های فوق تخصصی روان پزشکی کودک (ابن سینا و دکتر شیخ) و تمام مادران پسران ۵ تا ۱۲ ساله ی بهنجار مقطع پیش دبستانی و دبستان ناحیه ی ۴ مشهد بودند. از بین مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه با روش نمونه گیری در دسترس، ۵۰ نفر و از بین مادران کودکان بهنجار با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای ۸۰ نفر انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شاخص تنیدگی والدگری بودند. داده های به دست آمده با روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون تی گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که بین تنش والدگری (قلمرو والد) و مولفه های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه و مادران کودکان بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد ( $P < 0.001$ ) و نیز بین تنش والدگری (قلمرو کودک) و مولفه های آن در مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه و مادران کودکان بهنجار تفاوت معنی داری وجود دارد ( $P < 0.001$ ). نتیجه گیری: مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه در مقایسه با مادران کودکان بهنجار دارای تنش والدگری بیشتری هستند که باید با ابزار شاخص تنش والدگری تشخیص داده شود.

## کلمات کلیدی:

اختلال بیش فعالی و نقص توجه، بهنجار، تنش والدگری، کودکان

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1798967>

