

عنوان مقاله:

میزان اضطراب پرستاران ایرانی در دوران اپیدمی کووید-۱۹: یک فراتحلیل

محل انتشار:

دوماهنامه پایش، دوره 22، شماره 6 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

پروانه اصفهانی - *Department of Health Services Management, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

مهناز شبانی بورنگ - *Department of Health Services Management, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

الهام میربلوکی - *Department of Health Services Management, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

فائزه رسولخانی - *Department of Health Services Management, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

مرضیه عارفی - *Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

سمیرا علیرضایی - *Research Center for Social Determinant of Health, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran*

مهناز افشاری - *Research Center for Social Determinant of Health, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran*

سمیه سامانی - *Department of Health Services Management, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran*

خلاصه مقاله:

مقدمه: شیوع کووید-۱۹ پیامدهای روانی زیادی بر اقشار مختلف جامعه از جمله پرستاران داشته است. ترس و اضطراب ناشی از اپیدمی کووید-۱۹ در پرستاران علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های روحی و روانی باعث کاهش کیفیت خدمات و افزایش هزینه‌های نظام سلامت می‌گردد. این مطالعه باهدف تعیین میزان اضطراب پرستاران ایرانی در دوران اپیدمی کووید-۱۹ انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه فراتحلیل، کلیه مقالات علمی منتشر شده تعیین میزان اضطراب در دوران اپیدمی کووید-۱۹ در پرستاران ایرانی در ۵ پایگاه داده‌ای و موتور جستجوگر Google Scholar جستجو و ارزشیابی کیفیتی شدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I² و مدل متارگرسیون برای ارزیابی متغیرهای مظنون به ناهمگونی در سطح معناداری ۵/۰٪ بررسی شد. در نهایت، تعداد ۱۵ مقاله با استفاده از نرم افزار CMA تحلیل شد. یافته ها: بر مبنای مدل اثرات تصادفی، میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران ایرانی در دوران کووید-۱۹ برابر با ۲۹/۹۶ به دست آمد. بیشترین میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران در شهر اسلامشهر استان تهران در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۴/۰۸ و کمترین میانگین و انحراف معیار اضطراب پرستاران در بوشهر در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴/۳۷ به دست آمد. همچنین بین حجم نمونه و میزان اضطراب پرستاران ایرانی در دوران اپیدمی کووید-۱۹ ارتباط معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که پرستاران در دوران همه گیری کووید-۱۹ از اضطراب رنج می‌برند. بنابراین، سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت باید اقدامات جدی به منظور کاهش اضطراب پرستاران در دوران بحران به کار گیرند.

کلمات کلیدی:

Anxiety, Nurses, Coronavirus, Iran, اضطراب, پرستاران, کروناویروس, ایران

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1815955>

