

عنوان مقاله:

بررسی میزان اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی دچار خارش اورمیک

محل انتشار:

نشریه پرستاری مراقبت ویژه، دوره 12، شماره 1 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

محمد فصیحی - Shahed University, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran, IR Iran

مجیده هروی کریموی - Elderly Care Research Center- Shahed University, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran, IR Iran

ناهید رژه - Elderly Care Research Center- Shahed University, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran, IR Iran

سیدحمید شریف نیا - School of Nursing and Midwifery Amol, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, IR Iran

سمیه جوانمرد - Critical Care Nursing, Shahed University, Tehran, Iran

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: خارش اورمیک ناشی از بیماریهای مزمن کلیوی یکی از علایم مهم و شایع در این بیماران می باشد همچنین به طور شدیدتری در بیمارانی که در مراحل آخر بیماری های کلیوی مشاهده می گردد. شواهد بیانگر آن است اختلالات روانی، به خصوص اضطراب و افسردگی، در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی و تحت همودیالیز بسیار شایع هست؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان اضطراب و افسردگی در بیماران همودیالیزی دچار خارش اورمیک در بیمارستان های منتخب تهران در سال ۱۳۹۷ انجام گرفت. روش: این پژوهش به صورت مقطعی-تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل ۳۰۰ نفر از بیماران همودیالیزی دچار خارش اورمیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال ۱۳۹۷ بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه خارش یوسپیویچ و پرسشنامه اضطراب و افسردگی (HADS) بود. یافته ها: میانگین نمرات اضطراب $14/10 \pm 2/4$ و میانگین نمرات افسردگی $9/62 \pm 2/41$ حاکی از بالا بودن اضطراب و افسردگی این بیماران است. از میان متغیرهای دموگرافیک بین بیماری های ابتلا به زمینه ای با میزان اضطراب و افسردگی رابطه آماری معنادار یافت شد. با توجه به مقادیر نتایج آزمون (p-value)، بین میانگین شدت خارش اورمیک و اضطراب و افسردگی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: میزان اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز شرکت کننده در مطالعه بالا بوده که می تواند سلامت آن ها را به مخاطره بیاندازد. هم چنین نتایج نشان می دهد هر چه شدت خارش بیشتر باشد میزان اضطراب و افسردگی نیز بیشتر می شود. بنابراین می توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت درمان خارش از شدت افسردگی و اضطراب در این بیماران کاست.

کلمات کلیدی:

Key words: anxiety, depression, hemodialysis, uremic pruritus

اضطراب، افسردگی، همودیالیز، خارش اورمیک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1823365>



