

## عنوان مقاله:

الگوی پراکنش و شکل شناسی: *Apathya cappadocica urmiana* (Reptilia: Lacertidae) در ایران

## محل انتشار:

مجله زیست شناسی جانوری تجربی، دوره 1، شماره 2 (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

## نویسندگان:

حمید درویش نیا - عضو هیئت علمی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور

هیوا فیضی - دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

مهدی رجبی زاده - عضو هیئت علمی گروه تنوع زیستی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

## خلاصه مقاله:

در این مطالعه، با بررسی ویژگیهای زیستگاهی، پراکنش، داده‌های مورفومتریکی و مریستیک مربوط به تعداد ۵ نمونه از زیرگونه *Apathya cappadocica urmiana* Lantz and Suchow, ۱۹۳۴، الگوی پراکنش جدیدی برای آن در غرب فلات ایران ارائه شده است. این نمونه‌ها طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ جمع‌آوری شده‌اند. سابقاً دامنه پراکنش این زیرگونه فقط در استان آذربایجان غربی، در تنگه‌های اطراف دامنه‌های غربی دریاچه ارومیه شناخته می‌شد. در این مقاله، این زیرگونه از استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام نیز گزارش می‌گردد. بنابراین دامنه پراکنش این زیرگونه شامل مناطقی گسترده‌تر به سمت جنوب و غرب کوهستانهای زاگرس می‌باشد. توقف این مدل پراکنش در استان ایلام به سمت جنوب، یعنی آخرین حد پراکنش این زیرگونه توسط نقشه‌های توپوگرافی و اقلیم، تعیین و اطلاعات جدیدی در مورد زیست شناسی، پراکنش و مورفولوژی این زیرگونه ارائه شده است.

## کلمات کلیدی:

کلیدی: *Apathya cappadocica urmiana*، پراکنش، توپوگرافی، اقلیم، کوههای زاگرس

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1851640>

