

عنوان مقاله:

بررسی شیوع آلودگی به شپش سر و برخی از عوامل مرتبط در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کلالة، سال ۱۳۹۴

محل انتشار:

مجله تحقیقات سلامت در جامعه، دوره 2، شماره 3 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

آی ناز ملکی - Mazandaran University of Medical Sciences

جمشید یزدانی چراتی - Mazandaran University of Medical Sciences

فاطمه عبداللهی - Mazandaran University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: شپش یکی از بیماری های انگلی پوست انسان می باشد و به عنوان یک بیماری مسری در بسیاری از نقاط جهان گسترش دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع آلودگی به شپش سر در میان دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلالة انجام شده است. روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - مقطعی بود که در سال ۱۳۹۴ انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، ۵۴۱ دانش آموز به لحاظ آلودگی به شپش سر مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات به وسیله بررسی مستقیم پوست و موی سر و نیز پوشش آن ها و پرسشنامه انجام گرفت. شایان ذکر است که داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ۲۰ آزمون های آماری توصیفی و کای-دو (Chi-square)، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان معادل ۶ /۵ درصد بود. همچنین، تفاوت معناداری بین آلودگی به شپش سر و متغیرهای جنس، استفاده از وسایل شخصی، خوابیدن در اتاق مشترک، رعایت بهداشت فردی نظیر شستن مرتب دست با مواد شوینده، تعویض مرتب لباس و حداقل دوبار حمام کردن در هفته وجود داشت. درمقابل، رابطه معناداری بین پایه تحصیلی، محل سکونت، سن، شغل پدر، میزان تحصیلات والدین، تعداد اعضای خانوار، وجود حمام در منزل، داشتن مربی بهداشت و نوع مو با میزان آلودگی به شپش سر مشاهده نگردید. نتیجه گیری: شیوع فراوانی شپش سر در دانش آموزان شهرستان کلالة، تقریباً بالا میباشد. در این ارتباط، پیشنهاد میگردد به منظور جلوگیری از ابتلا به شپش سر، مربیان بهداشت، معلمان، والدین و دانش آموزان تحت آموزش قرار گیرند.

کلمات کلیدی:

Infestation, Head lice, Primary schools, Students
ابتدایی، مدارس، شپش سر، دانش آموزان، شپش سر، مدارس

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1863578>

