

عنوان مقاله:

بررسی ارتباط پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 26، شماره 9 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

حسن معیری - استاد گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

کسری مرادی - دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

مریم پورعباس عزیزی - دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

دانیال خضری - دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: ضایعات التهابی گرانولوماتوز پستان می تواند به عنوان التهاب اولیه و یا ایدیوپاتیک پستان مطرح باشد، لذا بررسی رابطه بین پارامترهای التهابی شامل نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و نسبت پلاکت به لنفوسیت در پیش آگهی ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک می تواند مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط پارامترهای خون مرتبط با لنفوسیت ها در پاسخ به درمان ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک انجام شد. روش کار: این مطالعه کوهورت آینده نگر در سال ۱۳۹۹ بر روی ۳۴ بیمار مبتلا به ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک پستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد. سیر پارامترهای لنفوسیتی بیماران با علائم بیماری، روند تشخیصی و درمانی مورد سنجش قرار گرفت. برای بیماران با تشخیص قطعی ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک، ابتدا در صورت وجود توده، آسپیره تحت گاید سونوگرافی انجام شد و نمونه برداری سوزنی و آزمایش های معمول از جمله شمارش کامل خون انجام شد. زمان انجام ارزیابی در بدو تشخیص، یک ماه و ۶ ماه بعد از شمارش کامل خون بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۴) و آزمون های آنالیز واریانس و آزمون های تعقیبی توکی انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین متغیرهای دموگرافیک سن و شاخص توده بدنی با نتیجه درمان در بیماران مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود نداشت (۰/۰۵).

کلمات کلیدی:

پلاکت، ماستیت گرانولوماتوز، نسبت، نوتروفیل

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1877467>

