

**عنوان مقاله:**

رونده شیوع عفونت ویروس هپاتیت B و هپاتیت C در میان اهداکنندگان خون استان سیستان و بلوچستان در یک مطالعه ۱۱ ساله از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

**محل انتشار:**

فصلنامه پژوهشی خون، دوره ۲۰، شماره ۴ (سال: ۱۴۰۲)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۱

**نویسنده‌گان:**

ابوالحسن صدری - استادیار گروه پزشکی بیماری‌های عفونی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

اسماعیل صانعی مقدم - مرکز تحقیقات انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان

سپهیلا خسروی - مرکز تحقیقات انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان

نرجس سرگلزایی - دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

احسن مخلصی - مرکز تحقیقات انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان

فهیمه حسینی - اداره کل انتقال خون استان سیستان و بلوچستان

یعقوب پودینه مقدم - مرکز تحقیقات انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان

محمدیه قدسی - مرکز تحقیقات انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و اداره کل انتقال خون زاهدان

**خلاصه مقاله:**

چکیده سابقه و هدف امروزه در سراسر جهان ارزیابی شیوع عفونت با ویروس‌های HBV و HCV به دلیل اهمیت جلوگیری از عفونت‌های منتقله از طریق انتقال فرآورده‌های خونی ضرورت دارد. در این مطالعه شیوع این دو ویروس‌عامل هپاتیت ویروسی را در میان اهداکنندگان خون استان سیستان و بلوچستان بررسی کردیم. مواد و روش‌ها این مطالعه گذشته نگر بر روی اهداکنندگان خون استان سیستان و بلوچستان و به منظور ارزیابی شیوع هپاتیت B و هپاتیت C و روند شیوع عفونت این ویروس‌ها، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انجام شد. نتایج توسط آزمون‌های من وینتی و کای دو و نرم افزار SPSS ۲۲ تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها شیوع عفونت هپاتیت B و هپاتیت C در اهداکنندگان استان سیستان و بلوچستان به ترتیب ۰/۳۲۹٪ و ۰/۵٪ بود. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، شیوع عفونت هپاتیت B، از ۸۱۸ مورد به ازای هر صد هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۹ مورد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. از سوی شیوع هپاتیت C، از ۱۰۲ مورد به ازای هر صد هزار نفر در سال ۱۳۹۰ به ۷۲ مورد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. نتیجه گیری نتایج مطالعه حاصل کاکشی از کاهش روند شیوع عفونت هپاتیت B و هپاتیت C طی یک دهه مورد ارزیابی در مطالعه بوده است که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر شاخص‌های بهداشتی و برنامه‌های پیشگیری کننده از عفونت‌های هپاتیت‌ها B و C باشد. کلمات کلیدی: اهدای خون، هپاتیت‌ها، ویروس‌ها، عفونت‌ها

**کلمات کلیدی:**

کلمات کلیدی: اهدای خون، هپاتیت‌ها، ویروس‌ها، عفونت‌ها

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1877518>



