

عنوان مقاله:

بررسی میزان تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲

محل انتشار:

مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا، دوره 31، شماره 4 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 9

نویسندگان:

فاضل دهون - Kurdistan University of Medical Sciences

رضا قانع قشلاق - Kurdistan University of Medical Sciences

ژینا بنفشی - Kurdistan University of Medical Sciences

مهسا مرادیانی - Kurdistan University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: انجام فعالیت های پیشگیرانه با مشارکت فعال بیمار و داشتن تبعیت از رژیم درمانی مهمترین رفتار مرتبط با بیماری دیابت است که سلامت مددجو را تضمین نموده و از شدت عوارض آن می کاهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهر سنندج در سال ۱۳۹۷ انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر تعداد ۱۸۱ نفر از بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر سنندج که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS-۱۶ و در سطح معنی داری $P < 0.05$ تحلیل شد. تجزیه و مزمن جمع آوری شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-۱۶ و در سطح معنی داری $P < 0.05$ تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده با آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی انجام شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی تبعیت از درمان واحدهای مورد پژوهش برابر $90/18 \pm 25/16$ بود. میانگین نمره کلی و نمره ابعاد مختلف تبعیت از درمان در بیمارانی که هموگلوبین گلیکوزیله غیرطبیعی داشتند به طور معنی داری بیشتر از بیماران با هموگلوبین گلیکوزیله طبیعی بود ($P < 0.001$). نتیجه گیری: بررسی های بیشتر و ارائه راهکارها و برنامه ریزی دقیق تر در جهت افزایش تبعیت از درمان این بیماران و پیشگیری از بروز عوارض ناشی از عدم تبعیت از درمان در آنان ضروری می باشد.

کلمات کلیدی:

Diabetes, Adherence to treatment, دیابت, تبعیت از درمان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1881367>

