

عنوان مقاله:

مقایسه اضطراب مرگ و شادکامی پرستاران شاغل در بخش کرونا با پرستاران شاغل در سایر بخش ها در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز در سال ۱۳۹۹

محل انتشار:

مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا، دوره 30، شماره 4 (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسنده‌گان:

School of Nursing and Midwifery, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran – افسانه پروین

عفت صادقیان (Home Care) Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran – عفت صادقیان

Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran – لیلی تپاک

Behavioral Disorders and Substance Abuse Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran – فرشید شمسایی

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف مقایسه اضطراب مرگ و شادکامی در پرستاران شاغل در بخش کرونا با پرستاران شاغل در سایر بخش ها در مراکز آموزشی شهر شیراز در سال ۱۳۹۹ انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه پژوهش ۱۵۵ نفر از پرستاران شاغل در بخش های کرونا و ۱۵۵ نفر از پرستاران شاغل در سایر بخش ها ای مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و متناسب با تعداد پرستاران در هر مرکز آموزشی درمانی انتخاب شدند. اینزار گردآوری داده ها پرسش نامه سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک، شادکامی آکسپورد، اضطراب مرگ تمپلر) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۶ تجزیه و تحلیل شد. از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: میانگین نمرات اضطراب مرگ در پرستاران بخش کرونا و سایر بخش ها به ترتیب 3.06 ± 3.38 و 8.34 ± 3.38 و 7.15 ± 3.38 و 39.77 ± 11.14 و 39.77 ± 10.38 و 45.43 ± 10.38 بود. میانگین نمرات شادکامی در پرستاران بخش کرونا و سایر بخش ها به ترتیب 11.14 ± 3.38 و 11.14 ± 3.38 بود. میانگین نمرات شادکامی پرستاران در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت ($p < 0.05$). میانگین نمرات شادکامی در پرستاران بخش کرونا و سایر بخش ها به ترتیب 11.14 ± 3.38 و 11.14 ± 3.38 بود. میانگین نمرات شادکامی پرستاران در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت ($p < 0.05$). همچنین بین اضطراب مرگ و شادکامی رابطه معکوسی وجود داشت ($r = -0.482$, $p < 0.01$). نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در موقعیت های بحرانی مانند پاندمی کovid-۱۹، سلامت روانی پرستاران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:

COVID-۱۹, اضطراب مرگ, پرستاری, شادکامی, کووید-۱۹, Death Anxiety, Happiness, Nursing

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1881470>

