

عنوان مقاله:

بررسی الگوی مصرف دارو باتوجه به کاتگوری تعیین شده توسط FDA در زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر همدان

محل انتشار:

مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا، دوره 19، شماره 1 (سال: 1390)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

دکتر ملیحه عراقچیان

دکتر ناهید رادنی

مریم سلیمی

معصومه نمازی

دکتر سعادت ترابی

خلاصه مقاله:

مقدمه و هدف: مصرف دارو در بارداری خطراتی را برای مادر و جنین در بر دارد. FDA مصرف داروها در بارداری را دسته بندی کرده و به عنوان راهنمای درمانی برای پزشکان محسوب می شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مصرف دارو در بارداری بوده است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه بود. تعداد نمونه ۲۰۰ زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان بود که در سه ماهه سوم بارداری بودند. نتایج: میزان شیوع مصرف دارو ۴۴ درصد، بدون در نظر گرفتن ویتامین و مواد معدنی بود. میانگین تعداد داروهای مصرفی بوسیله زنان باردار ۷/۱ و میزان مصرف خو سرانه دارو ۴/۱ درصد بوده است. بیشترین داروی مصرفی در سه ماهه اول ضد دردها، در سه ماهه دوم آنتی بیوتیکها و در سه ماهه سوم داروهای گوارشی بوده است. رابطه معنی داری بین سطح تحصیلات و مصرف خود سرانه دارو وجود دارد ($P < 0/05$). در این پژوهش بیشترین گروه دارویی مورد استفاده در هر سه ماهه بارداری کاتگوری B بوده است. میزان مصرف دارو با کاتگوری X از تقسیم بندی FDA در سه ماهه اول بیش از سه ماهه دوم و سوم بوده است. نتیجه نهایی: بیشتر زنان در طول بارداری دارو مصرف کرده بودند و پر مصرف ترین گروه دارویی در سه ماهه اول داروهای ضد درد بودند. در سه ماهه اول بارداری از داروهای کاتگوری X که در بارداری منع مصرف دارد، استفاده شده که شایعترین آنها هورمونهای جنسی بود.

کلمات کلیدی:

Analgesic / Drug use / Pregnancy، بارداری، مصرف دارو، ضد درد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1884371>

