

عنوان مقاله:

تاثیر بیدردی اپیدورال و اسپینال بر پیامدهای مادری و نوزادی در زایمانهای طبیعی

محل انتشار:

مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا، دوره 25، شماره 3 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

ناهید رادینا - Hamadan University of Medical Sciences

مریم عطااللهی - Hamadan University of Medical Sciences

سمیرا توکلیان - Hamadan University of Medical Sciences

نسرین موفق - Hamadan University of Medical Sciences

مرضیه اتوگرا - PhD of health education and health promotion, Department of public health, health sciences research center, faculty of health, Hamadan University of Medical sciences, Hamadan, Iran

نسرین شیرمحمدی خرم - Hamadan University of Medical Sciences

فریده کاظمی - Shahid Beheshti University of Medical Sciences

خلاصه مقاله:

مقدمه. کاهش مناسب درد زایمانی همواره یکی از مهمترین اهداف علم طب بوده است و درخواست تسکین درد لیبر از طرف بیمار ضرورت کافی برای کاربرد روشهای تسکین درد محسوب می شود. این مطالعه جهت مقایسه تاثیر بیدردی اسپینال و اپیدورال بر پیامدهای مادری و نوزادی انجام شد. روش کار. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی ۱۲۶ زن باردار انجام شد. زنان بارداری که معیارهای ورود به مطالعه و رضایتنامه جهت انجام زایمان بیدرد را داشتند وارد مطالعه شدند. و در گروههای زایمان بی درد (اسپینال و اپیدورال) قرار گرفتند. گروه کنترل نیز از بین افرادی انتخاب شدند که معیارهای ورود را دارا بوده ولی تمایلی به انجام زایمان بیدرد نداشتند. سه گروه با استفاده از آزمونهای آماری مورد مقایسه قرار گرفتند. $p < 0.05$ نیز معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها. نتایج نشان داد طول مراحل اول و دوم لیبر در گروه بدون مداخله کمتر از گروههای بیدرد بود ولی این تفاوتها از نظر آماری معنی دار نبود. نوع زایمانها، نمرات آپگار نوزاد و میزان درد اپیزیاتومی نیز بین سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. هیچ یک از مادران در گروهها مبتلا به عوارضی مانند سردرد و هیپرترمی نشدند. نتیجه گیری. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که هیچ یک از روشهای بیدردی مورد استفاده تاثیرات منفی بر پیامدهای مادری و نوزادی نداشتند. با توجه به نتایج ضد و نقیضی که در مطالعات مختلف نشان داده شده است، انجام مطالعات بیشتر در شرایط یکسان و با گروههای همسان از نظر متغیرهای مداخله گر ضروری بنظر می رسد.

کلمات کلیدی:

Epidural analgesia, spinal analgesia, first stage of labor, second stage of labor

بیدردی اپیدورال، بیدردی اسپینال، مرحله اول لیبر، مرحله دوم لیبر

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1884431>



