

عنوان مقاله:

بکارگیری توصیه فنی در کشت مجدد برنج جهت پایداری اکوسیستم شالیزاری

محل انتشار:

مجله شالیزار، دوره 1، شماره 1 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسنده:

خلاصه مقاله:

مدیریت مزرعه در کشت مجدد برنج می‌بایستی بر اساس دانش اکوفیزیولوژیکی گیاه برنج باشد. بر اساس آمار سال ۱۳۹۶ سازمان جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت مجدد برنج در استان مازندران ۴۵ هزار هکتار بود. تنش‌های زنده و غیر زنده باعث کاهش محصول در کشت مجدد می‌شوند. بنابراین بکارگیری توصیه فنی و رقم مناسب، جهت حصول عملکرد مطلوب ضروری است. تاریخ مناسب نشاکاری در کشت مجدد برنج، نیمه اول مرداد ماه است. طول دوره رشد گیاهچه در خزانه ۱۵ تا ۱۷ روز است. جهت تهیه زمین اصلی، جمع‌آوری کاه و کلس حاصل از کشت اول برنج و خروج آن از سطح مزرعه ضروری است. مصرف کود NPK کم تر از کشت اول ولی تراکم نشا در واحد سطح بیشتر از کشت اصلی باشد. وجین دستی یکبار، کنترل آفت ساقه‌خوار از حشره‌کش توصیه شده توسط حفظ نباتات در دو نوبت، مرحله رویشی و زایشی، کنترل بیماری بلاست با قارچ‌کش ناتوو به میزان ۱۶۰ گرم در هکتار در صورت نیاز در مرحله گلدهی استفاده شود. آبیاری تناوبی تا مرحله گلدهی ادامه یابد و در مهر و آبان ماه به‌خاطر بارندگی نیازی به آبیاری نیست.

کلمات کلیدی:

به زراعی، زمان نشاکاری، کشت مجدد برنج، عملکرد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1888310>

