

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر روش های قنداق و ایجاد لانه در رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 11، شماره 2 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

زهرا عراقی - MSc student in Neonatal Intensive Care, School of Nursing and Midwifery, Mashhad, Iran

طیبه ریحانی - Instructor, Department of Child and Infant, School of Nursing and Midwifery, Mashhad, Iran

طاهره صادقی - Assistant Professor of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad, Iran

اشرف محمدزاده - Professor, Neonatologist, Neonatal Research Center, Imam Reza Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

خلاصه مقاله:

مقدمه: استفاده از موادمخدر در دوران بارداری با آسیبهایی مانند زایمان زودرس، وزن کم هنگام تولد و بروز عوارض شدیدی نظیر سندرم محرومیت در نوزاد همراه است که منجر به افزایش استرس، کاهش قدرت خودتنظیمی و بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان میشود. با تشدید استرس ناشی از محیط بخش در این نوزادان، نیاز به استفاده از رویکرد مراقبت تکاملی وجود دارد. قنداق و لانه از مداخلات رفتاری موثر برای این نوزادان میباشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر روشهای قنداق و ایجاد لانه در رفتارهای خودتنظیمی نوزادان مادران معتاد انجام شده است. روش کار: این کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع بر روی ۳۰ نوزاد با مادر معتاد و بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان شهر مشهد، با سن حاملگی ۳۲ تا ۳۸ هفته واجد شرایط، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. نوزادان به ترتیب زمان ورود به بخش به صورت یک در میان در دو گروه سه روز اول قنداق (A) و سه روز اول لانه (B) و سه روز دوم در گروه مقابل قرار گرفتند. مدت مداخله شش روز بود. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، فرم چک لیست مشاهده رفتارهای نوزاد جهت ارزیابی استرس و خودتنظیمی استفاده گردید. دادهها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: براساس نتایج حاصل از آزمون تی مستقل میزان درصد رفتارهای خودتنظیمی، در گروه سه روز اول قنداق و گروه سه روز اول لانه تفاوت معنی دار نداشت ($P = 0/060$). درصد خودتنظیمی بر اساس حرکات دهان و تنفس و الگوی حرکت و صورت در گروه قنداق معنی دار بوده و درصد خودتنظیمی بر اساس رنگ و وضعیت و حالت در گروه لانه معنی دار بوده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد تاثیر قنداق و لانه بر رفتارهای خودتنظیمی نوزاد با مادر معتاد تفاوت معنی دار با یکدیگر نداشته است. هر دو روش در رفتارهای خودتنظیمی نوزاد موثر بوده است. بنابراین این دو روش تفاوت عمدهای با یکدیگر ندارند. پس از مطالعه رفتار و بر حسب شرایط نوزاد، بخش و تمایل مادر میتوان یکی از آنها را انتخاب نمود.

کلمات کلیدی:

Swaddle, Nest, Behavioral Self-regulation, Neonate, Addicted Mother, قنداق, لانه, رفتار خودتنظیمی, نوزاد, مادر معتاد

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1889341>



