

عنوان مقاله:

فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در نمونه کیسه صفراى بیماران کله سیستکتومی شده در بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی افضلی پور و باهنر کرمان در سال ۱۳۹۴

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره ۸، شماره ۴ (سال: ۱۳۹۵)

تعداد صفحات اصل مقاله: ۸

نویسندگان:

محمد رضا لشکری زاده

محمد مهدی حیاتبخش

حسین نیکپور

حسینعلی سلطانی

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: باکتریهای اپیتلیوم کیسه صفرا و مجاری صفراویمنبع قدرتمندی برای ایجاد بیماریهای کیسه صفرا هستند. از آنجا که ابتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی در التهاب مزمن مخاط معده دارد شرایط بروز زخم پپتیک و آدنوکارسینوم معده را فراهم می نماید. مطالعات اخیر ارتباط بین این باکتری و کانسر کیسه صفرا را محتمل دانسته اند. هدف تعیین فراوانی هلیکوباکترپیلوری در نمونه کیسه صفراى بیماران مبتلا به کله سیستیت و بررسی تغییرات پاتولوژیک مواد و روش کار: تعداد ۱۰۰ نفر بیماران با تشخیص کله سیستیت به صورت تصادفی انتخاب شدند. در اتاق عمل پس از خروج کیسه صفرا تست اوره آز بر روی آن انجام شده سپس نمونه کیسه صفرا داخل محلول فرمالین به آزمایشگاه بیمارستان افضلی پور کرمان منتقل شد. توسط رنگ آمیزی گیمسا وجود هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. همچنین تغییرات پاتولوژیک نظیر هیپرپلازی و متاپلازی/دیسپلازی و انفیلتراسیون لنفاوی توسط گروه پاتولوژی گزارش شد و جمع آوری شدند. یافته ها: در نمونه ی ۲۳٪ افراد، هلیکوباکترپیلوری مشاهده شد که از این ۲۳٪، ۳۹.۱٪ مرد و ۶۶.۹٪ زن بودند همچنین ۴.۳٪ کله سیستیت حاد و ۹۵.۷٪ کله سیستیت مزمن داشتند و در ۲۱.۷٪ موارد تغییرات پاتولوژیک داشتند، که از بین این تغییرات، انفیلتراسیون لنفاوی و سلول های التهابی منونوکلئر بیشتر مشاهده شد. نتیجه گیری: در این مطالعه فراوانی هلیکوباکترپیلوری و تست اوره آز با تغییرات پاتولوژیک ارتباط معنادار داشت ولی با سن و جنس و وضعیت بیماری ارتباطی نداشتند

کلمات کلیدی:

Helicobacter pylori, cholecystitis, cholecystectomy, هلیکوباکترپیلوری، کله سیستیت، کله سیستکتومی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1889397>

