

عنوان مقاله:

فراوانی برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمان طبیعی بعد از سزارین و سزارین تکراری در بیمارستان بنت الهدی

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 8، شماره 1 (سال: 1395)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

سکینه نظری - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

محبوبه طباطبایی چهر - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مریم باقری - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سید حمید شریف نیا - دانشکده پرستاری و مامایی آمل

خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: میزان استاندارد زایمان سزارین از دید سازمان جهانی بهداشت ۱۵٪ است که در اکثر نقاط دنیا تفاوت زیادی با میزان توصیه شده وجود دارد. یکی از موثرترین راه حل ها برای کاهش شیوع سزارین، انجام زایمان طبیعی بعد از سزارین و کاهش سزارین تکراری است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی و برخی پیامدهای مادری و نوزادی زایمان طبیعی بعد از سزارین و سزارین تکراری در بیمارستان بنت الهدی بجنورد انجام شد. مواد و روش کار: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی، بر روی ۱۸۰ مادر واجد شرایط، در سال ۱۳۹۲ و در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بیمارستان بنت الهدی انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه دموگرافیک، پیامدهای مادری، پیامدهای مربوط به نوزاد است. از نرم افزار SPSS18 و آمار توصیفی است. یافته ها: نتایج نشان داده ۸/۴۷٪ مادران مطالعه موفق به انجام زایمان طبیعی به دنبال سزارین شدند. از پیامدهای مادری خونریزی، تب و پیامدهای نوزادی بر اساس نتایج آزمون دقیق فیشر در دو گروه تفاوت معنا دار آماری نداشت اما مادران گروه زایمان طبیعی به دنبال سزارین، پارگی رحم در مرحله اول، هیستروکتومی و یبوست کمتری در مقایسه با گروه سزارین تکراری داشتند که در مورد یبوست تفاوت از نظر آماری معنا دار بود. (p=۰۰۵) نتیجه گیری: در صورت انتخاب دقیق افراد می توان برای کاهش سزارین های غیر ضروری از زایمان طبیعی به دنبال سزارین استفاده کرد. واژه های کلیدی: پیامدهای مادری و نوزادی، زایمان طبیعی به دنبال سزارین، سزارین

کلمات کلیدی:

Maternal and neonatal outcomes, vaginal birth after Cesarean, Cesarean

پیامدهای مادری و نوزادی، زایمان طبیعی به دنبال سزارین، سزارین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1889540>

