

## عنوان مقاله:

در رفتگی دو طرفه قدامی مفصل شانه بدنبال مصرف ترامادول

## محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 7، شماره 4 (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

## نویسندگان:

محمد رضا صفدری - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مریم توکلی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پریسا تفقدی - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

مهسا رحیمیان - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

محسن آباد - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

## خلاصه مقاله:

مصرف ترامادول می تواند منجر به تشنج شده و باعث دررفتگی دو طرفه قدامی مفصل شانه شود. گزارش حاضر در خصوص یک مورد نادر از در رفتگی دو طرفه قدامی شانه به دنبال تشنج در خواب در یک مرد ۳۲ متعاقب مصرف تک دوز ۳۰۰ ترامادول می باشد. بیمار هیچگونه سابقه دررفتگی خودبخودی شانه را نداشته است. رادیوگرافی و MRI دررفتگی دو طرفه قدامی شانه همراه با شکستگی توبروزینه بزرگ استخوان بازوی راست نشان داد. تشنج به عنوان یک عارضه مصرف ترامادول می تواند در خواب اتفاق افتاده و باعث عوارض جدی برای بیمار گردد. واژه های کلیدی: ترامادول، دررفتگی شانه، تشنج

## کلمات کلیدی:

Tramadol, shoulder dislocation, seizure, ترامادول, دررفتگی شانه, تشنج

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1889555>

