

عنوان مقاله:

بررسی فراوانی ناهنجاریهای آشکاردرنوزادان متولد شده در بیمارستان امیرالمومنین سیستان

محل انتشار:

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دوره 6، شماره 3 (سال: 1393)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

سوسن حسینی - دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل

عباس نیک روش - دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

زهره سادات هاشمی - دانشکده مامائی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل

ناهید رخی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،

خلاصه مقاله:

چکیده زمینه و هدف: ناهنجاریهای مادرزادی از علل مهم معلولیت و مرگ و میر نوزادان است. این ناهنجاریها در زمان بارورشدن تخم یا هنگام تکوین مراحل جنینی عارض می شوند. شیوع آن ۳-۵ درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده برآورد گردیده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان فراوانی ناهنجاریهای آشکار در نوزادان متولد شده در منطقه سیستان می باشد. مواد و روش کار: روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی به روش مقطعی است که بر روی کلیه نوزادان زنده متولد شده طی سه ماه از نظر ناهنجاریهای آشکار مادرزادی انجام گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و مشتمل بر مشخصات والدین و نوزاد و نوع ناهنجاری بود که توسط پزشک متخصص کودکان تایید گردید. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS۱۹ تحلیل شد. یافته ها: از مجموع ۱۸۰۰ نوزاد تولد یافته در بیمارستان امیرالمومنین زابل، ۳۴ مورد دارای ناهنجاری آشکار مادرزادی بودند. میزان فراوانی ناهنجاری های آشکار در منطقه سیستان ۸/۱٪ بدست آمد. فاکتور سن مادر با بروز ناهنجاری های طناب عصبی ارتباط معنی داری نشان داد ($p < 0.05$). بیشترین ناهنجاری درسیستم گوش، چشم، صورت با شیوع ۵/۲۹٪ می باشد و پس از آن ناهنجاری سیستم عصبی قرار دارد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان میدهد که میزان بروز ناهنجاری مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده در شهر زابل مشابه مطالعات پیشین در زمینه ناهنجاری می باشد.

کلمات کلیدی:

Keywords: apparent anomalies, birth, stillborn, consanguineous marriage

واژه های کلیدی: ناهنجاری های آشکار، نوزاد، ازدواج های خویشاوندی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1889705>

