

## عنوان مقاله:

بررسی ارتباط سیالی کلام با برخی ویژگی های بالینی در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

## محل انتشار:

مجله تازه های پژوهشی روان تنی، دوره 1، شماره 3 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

## نویسندگان:

Nazila Akbarfahimi - Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Maryam Pouramiri - Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Mojtaba Azimian - Department of Clinical Sciences, University of Social Welfare and Rehabilitation sciences, Tehran, Iran

Ebrahim Pishyareh - Department of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

Samaneh Hossienzadeh - Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

## خلاصه مقاله:

زمینه و هدف اختلال سیالی کلام یکی از انواع اختلالات شناختی در افراد مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس است. یکی از عوامل موثر بر سیالی کلام، ویژگی های بالینی این افراد است. در این مطالعه ارتباط برخی از ویژگی های بالینی بر سیالی کلام افراد ام اس بررسی شده است. مواد و روش مطالعه توصیفی مقطعی حاضر بر روی ۷۱ بیمار مبتلا به ام اس در بیمارستان توانبخشی رفیده انجام شد. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه کیفیت خواب پیتزبورگ، مقیاس ارزیابی خستگی، فرم کوتاه ارزیابی افسردگی و آزمون سیالی کلام بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ استفاده شد. جهت بررسی اثر هم زمان متغیرهای مستقل بر سیالی کلام مدل رگرسیون خطی تعمیم یافته برازش شد. یافته ها مطالعه شامل ۶۷/۶ درصد بیماران زن و ۳۲/۴ درصد بیماران مرد بود. میانگین سنی بیماران در این مطالعه ۴۳/۹±۳۵/۵۴ سال و میانگین مدت زمان ابتلا به بیماری ۱۳/۸۳±۵/۶۲ سال بود. برخی ویژگی های بالینی مانند خستگی، نوع بیماری، اولین علامت بروز یافته بیماری و وضعیت خواب با نمره سیالی کلام دارای رابطه معنادار بود ( $P < 0/05$ ). بین ناتوانی فیزیکی، افسردگی و مدت زمان ابتلا به بیماری با سیالی کلام در افراد ام اس رابطه معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری یافته ها نشان داد بیماران با نوع پیش رونده بیماری و بیمارانی که شروع بیماری با علائم بینایی گزارش شده بود، عملکرد ضعیف تر در سیالی کلام نسبت به سایر شرکت کنندگان داشتند. این موضوع را می توان در مراحل اولیه تشخیص بیماری مد نظر قرار داد.

## کلمات کلیدی:

Multiple sclerosis (MS), Clinical characteristics, Verbal fluency, مالتیپل اسکلروزیس, ویژگی های بالینی, سیالی کلام

## لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1898781>

