

عنوان مقاله:

مقایسه تاثیر داروهای آنتی کواگولان خوراکی و تزریقی در میزان خونریزی در بیماران تحت جراحی های ژنیکولوژیک انکولوژیک

محل انتشار:

مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، دوره 26، شماره 12 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 10

نویسندگان:

سپهلا امینی مقدم - استاد گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

امینه عرب خزائل مهابادی - رزیدنت گروه زنان و مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:

مقدمه: سرطان های زنان از جمله آندومتر، تخمدان، سرویکس و ولوو، از جمله سرطان های رایج زنان بوده و یکی از مهم ترین درمان های موثر، استفاده از تکنیک جراحی می باشد. امروزه استفاده از داروهای ضد انعقاد تزریقی (هپارین و انوکسپارین) قبل و بعد از جراحی های سرطان زنان در پروتکل های درمانی رایج می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر داروهای آنتی کواگولان خوراکی (آپیکسابان) و تزریقی (انوکسپارین) در بیماران تحت جراحی های ژنیکولوژیک انکولوژیک انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بر روی ۸۰ نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی ایران با عارضه سرطان زنان (تخمدان، رحم، سرویکس، ولوو و واژن، ...) که بیماری آنها توسط ارزیابی های آزمایشگاهی، تشخیصی و پزشک متخصص تایید شده و برای جراحی تشخیص داده شده بودند، انجام شد. تمام بیماران بعد از ترخیص در طی ۲۸ روز از دو پروتکل درمانی دارویی ضد انعقاد خوراکی و یا داروی تزریقی استفاده کردند. اطلاعات دموگرافیک و شاخص های آزمایشگاهی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۲۲) و آزمون من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین گروه های دریافت کننده ضد انعقاد های خوراکی و تزریقی، تاثیر در میزان خونریزی بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک نتیجه گیری: استفاده از ضد انعقاد های خوراکی و تزریقی، تاثیر در میزان خونریزی بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان های ژنیکولوژیک ندارد.

کلمات کلیدی:

آپیکسابان، جراحی های انکولوژیک، هپارین

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1947245>

