

## عنوان مقاله:

تعیین رابطه سبک دل بستگی با وابستگی متقابل در همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده

## محل انتشار:

هجدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 15

## نویسندگان:

حمیده عظیمی لوتی - دانشیار، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، گروه روان پرستاری مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ایران

حجت اله ولی پور - کارشناسی ارشد روان پرستاری، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ساری ایران

یدالله جنتی - استادیار، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، پژوهشکده اعتیاد، گروه روان پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ساری ایران

علی اصغر نادى فرا - دکترای آمار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ایران

آذر رضانی - کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، مرکز تحقیقات و علوم رفتاری و پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ساری ایران

مریم رستم وند - کارشناسی روان پرستاری، مرکز تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ساری ایران

## خلاصه مقاله:

زمینه و هدف: اعتیاد پدیده ای آسیب زنده به اقتصاد، سلامتی و بنیان خانواده ها می باشد اعضای خانواده های فاقد روابط صمیمی والدین - فرزندان و پیوندهای ایمن تمایل به مصرف مواد بیشتری دارند. از پیامدهای زندگی با افراد معتاد، وابستگی متقابل همسران می باشد. لذا مطالعه ای با هدف تعیین رابطه سبک دل بستگی و وابستگی متقابل همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده طراحی گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی همبستگی در سال ۱۴۰۰ روی ۹۸ نفر از همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد تحت درمان نگهدارنده مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان روان پزشکی زارع ساری به صورت تصادفی ساده، انجام شد. ابزارهای مورد استفاده مقیاس دل بستگی بزرگسالان کولینز و رید و پرسشنامه وابستگی متقابل اسپین و فیشر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss-۲۲ روش های آماری توصیفی و استنباطی (کای اسکوتر، t مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و رگرسیون خطی) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین و انحراف معیار سبک دل بستگی ایمن  $2/21 \pm 11/88$  نایمن  $2/60 \pm 12/11$ ، دو سوبه همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد  $4/50 \pm 11/71$  و وابستگی منفی  $r = 0.22$  و  $P < 0.05$  و بین وابستگی متقابل با دل بستگی دو سوبه - اضطرابی همبستگی مثبت وجود داشت  $R = 0.496, P < 0.05$  نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد برای پیش بینی وابستگی متقابل از سبک های دل بستگی تنها سبک دل بستگی دوسوبه - اضطرابی به طور معنی داری می تواند ۳۱ درصد تغییرات وابستگی متقابل همسران بیماران معتاد تحت درمان نگهدارنده را پیش بینی کند و همچنین وابستگی متقابل در همسران بیماران مبتلا به مصرف مواد با مدت زمان مصرف مواد، رتبه تولد و تجربه وقایع فشارزا در ۶ ماه اخیر ارتباط معنی داری داشت. نتیجه گیری: وابستگی متقابل با سبک دل بستگی ارتباط معنی داری داشت و باید همراه با بیماران معتاد به همسران آنان و همسرانی که دل بستگی دوسوبه اضطرابی دارند به منظور پیشگیری از وابستگی توجه بیشتری نمود.

## کلمات کلیدی:

سبک های دل بستگی، وابستگی متقابل، همسران، سومصرف مواد مخدر، درمان نگهدارنده

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1949061>

