

عنوان مقاله:

مروری بر مدیریت و درمان جفت ماندگی در گاو شیری

محل انتشار:

نهمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 8

نویسندگان:

امیرمحمد میرجردوی - دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

علیرضا ناصری مقدم - دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

محمدعلی سیف الهی ده میری - دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

خلاصه مقاله:

به طور گسترده پذیرفته شده است که دوره ترنژیشنال در گاو شیری با احتمال بالای بروز بیماری هایمیتابولیک و عفونی شناخته می شود. عدم دفع غشاهای جنین پس از ۲۴ ساعت پس از زایمان یک وضعیت پاتولوژیک تلقی می شود که به عنوان جفت ماندگی شناخته می شود. به طور معمول دفع جفت ۳ تا ۸ ساعت پس از زایمان گوساله رخ می دهد. چند نشانه مهم مرتبط با جفت ماندگی، تخریب، تغییر رنگ و آویزان شدن پرده های جنین بیشتر از ۲۴ ساعت پس از زایش است.

کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1964069>

