

**عنوان مقاله:**

تأثیر نگرانی بر نشانگان استرس پس از سانحه و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی خستگی

**محل انتشار:**

فصلنامه بیماری‌های پستان، دوره 17، شماره 1 (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 18

**نویسنده‌گان:**

سارا قاسم زاده بركى - Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

مهناز شاهقلیان قهفرخی - Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

محمد حسین عبداللهی - Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

**خلاصه مقاله:**

مقدمه: نگرانی در مورد عود سرطان به عنوان شایع ترین بار روانی در بیماران و نجات یافتنگان از سرطان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خستگی در تأثیر نگرانی بر نشانگان استرس پس از سانحه و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در چارچوب یک طرح همبستگی از نوع مدل آزمایی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان کسری و مرکز پژوهش‌های سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۱ بودند که از بین آن‌ها و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ۲۲۰ نفر انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسش نامه نگرانی (PSWQ)، چک لیست PTSD برای غیرنظامیان (PCL-5)، مقیاس ترس از عود سرطان (FCRI) و مقیاس خستگی ناشی از سرطان (CFS) بود. یافته‌ها در چارچوب مدل آزمایی معادلات ساختاری و در فضای نرم افزارهای SmartPLS ۴ و SPSS ۲۷ تحلیل شدند. یافته‌ها: شاخص‌های برازش مدل مفهومی پژوهش ( $\text{NFI} = 0.94$ ) و ( $\text{SRMR} = 0.06$ ) مطلوب بود. نتایج به دست آمده از مدل آزمایی معادلات ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم و معنادار شدند. نگرانی بر  $P < 0.001$ :  $T = 6.2/3$ ;  $\beta = 0.287$ ;  $\text{NFI} = 0.94$ ;  $\text{SRMR} = 0.06$ ;  $\text{PSWQ} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 8.9/3$ ;  $\beta = 0.310/0$ ;  $\text{CFS} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 5/31$ ;  $\beta = 0.0390$ ;  $\text{FCRI} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 3/73$ ;  $\beta = 0.052/0$ ;  $\text{SmartPLS} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 3/74$ ;  $\beta = 0.049/0$ ;  $\text{SPSS} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 4/49$ ;  $\beta = 0.057/0$ ;  $\text{PSWQ} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 7.857$ ;  $\beta = 0.052/0$ ;  $\text{CFS} = 0.001 > P < 0.001$ :  $T = 5/49$ ;  $\beta = 0.052/0$ . شایان ذکر است در تأثیر نگرانی بر PTSD خستگی نقش میانجی جزئی داشت. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که خستگی می‌تواند نشانگان استرس و ترس از عود سرطان را در بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش دهد. از آنجا که خستگی زودهنگام می‌تواند تأثیر تشخیص و درمان سرطان را بر عملکرد فردی و کیفیت زندگی این بیماران افزایش دهد، بدین سان یافته‌های پژوهش حاضر برای ارائه دهنگان مراقبت‌های بهداشتی و نجات یافتنگان از سرطان پستان موثر است و پژوهش‌های آتی باید بر استفاده از مداخله‌های روان‌شنختی سرطان برای این جمعیت در حال رشد در ایران متمنز شوند.

**کلمات کلیدی:**

سرطان پستان, Barest Cancer, Cancer-related PTSD, Cancer-related anxiety, Fatigue سرطان

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1965871>