

عنوان مقاله:

بررسی فلورستیک و شکل زیستی گیاهان مطالعه موردی: مراتع لوس بلده نور استان مازندران

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست) (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:

مژگان مرفع - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربی

قاسمعلی دیانتي تیلکی - دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

حسن قلیچ نیا - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

بهنام بهرامی - کارشناس ارشد رشته مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

بررسی فلورستیک هر منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا فهرست فلورستیک، شناسنامه‌های برای هر منطقه است که وجود گیاهان و وضعیت آنها را نشان می‌دهد، که در واقع به عنوان مطالعه زیر بنایی برای سایر طرحهای تحقیقاتی محسوب می‌گردد. این مطالعه در مراتع کوهستانی شهرستان نور استان مازندران واقع در محدوده ارتفاعی 1900-2700 متری از سطح دریا، با میانگین بارندگی 600 میلی متر و متوسط دمای 12 درجه سانتی گراد و در مساحت حدودا 2300 هکتار انجام گردید. به منظور شناسایی و معرفی فلور، تنوع زیستی و بررسی شکل زیستی گیاهان، پوشش گیاهی منطقه، بررسی شد. که در نتیجه آن، تعداد 72 گونه گیاهی از 58 جنس و 25 تیره جمعآوری و شناسایی شدند. از نظر تعداد گونه، تیره نعناع Labiatae با 12 گونه و تیره کاسنی Compositae و بقولات Leguminosae هر کدام با 7 گونه و تیره شب بو Brassicaceae و گندمیان Gramineae هر کدام با 6 گونه مهمترین تیره‌های موجود در منطقه بودند. بررسی اشکال زیستی گونه‌های گیاهی موجود در منطقه نشان می‌دهد که همیکریپتوفیت ها 61 درصد و تروفیت ها با 22 درصد سهم بیشتری از گونه‌های موجود در منطقه را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین بررسیها نشان می‌دهد بیشتر گونه‌های موجود در منطقه را گونه‌های دائمی تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده سازگاری گونه‌های چندساله به شرایط آب و هوایی و ادافیکی منطقه میباشد

کلمات کلیدی:

فلور، تنوع زیستی، شکل زیستی، همی گریپتوفیت، لوس، بلده نور

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/196908>

