سیویلیکا – ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا CIVILICA.com



محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 27

نویسندہ: علی بھزاد – دانشج*وی* دندانپزشکی سماشکو

خلاصه مقاله:

پریودنتیت (یا بیماری پریودنتال) یک عفونت باکتریایی در بافت ها، رباط ها و استخوان هایی است که دندان های شما را احاطه کرده و از آن حمایت می کنند، که در مجموع به نام پریودنتیوم شناخته می شود. بیماری پریودنتیت جز عفونت های جدی لثه است و موجب التهاب بافت های اطراف لثه می شود. این بیماری بافت استخوانی اطراف دندان را به کندی و پیوسته از بین می برد. باکتری به سطح دندان چسبیده و تکثیر می شوند و بدن هایی با ایمنی بالا دارند به این عمل، واکنشی نظیر التهاب نشان می دهند. این عارضه اگر درمان نشود نهایتا منجر به از دست رفتن دندان ها و بالا رفتن خطر سکته قلبی می شود.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه پرویودنتیت وپوسیدگی دندان می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مروری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد علائم اولیه پریودنتیت شامل حساسیت، تورم، خونریزی و قرمز شدن لثه ها و همچنین بوی بد دهان (هالیتوز) می شود. با از دست دادن استخوان بیشتر دندان ها شل شده و جابجا می شوند و جویدن غذا به یک فرآیند دردناک تبدیل می شود. اغلب اوقات، پریودنتیت باعث کچ شدن دندان های جلوبی به سمت دندان های مجود بین و میود در این ها ش شان داد علائم کند، مگر اینکه عفونت جدی ایجاد شود، میدن چرک در پریودنتیت باعث کم شدن دندان های جلوبی به سمت دندان های مجود دن ای شده و جابجا می شوند و کند، مگر اینکه عفونت جدی ایجاد شود، میدن چرای و قرمز شدن لثه ها و همچنین بوی بد دهان (هالیتوز) می شود. با از دست دادن استخوان بیشتر دندان ها شل شده و جابجا می دویدن غذا به یک فرآیند دردناک تبدیل می شود. اغلب اوقات، پریودنتیت باعث کچ شدن دندان های جلوبی به سمت دندان های مجاور می شود. پریودنتیت معمولا در ابتدا هیچ دردی ایجاد نمی کند، مگر اینکه عفونت جدی ایجاد شود، مانند جمع شدن چرک در پریودنتیت باعث کچ شدن دندان های جلوبی به سمت دندان های مجاور می باشد.

كلمات كليدى:

پرويودنتيت، پوسيدگي دندان، پيرادندان، پوسيدگي

لينک ثابت مقاله در پايگاه سيويليکا:

https://civilica.com/doc/2021304

